

1. PICRIDIUM TINGITANUM. DESF.

P. annum; caule subfoliato, superne ramoso; foliis lanceolatis pl. pinnatifidis rarius integris; pedicellis subesquamosis; involuci squamis margine lato, albo, scarioso munitis, inferioribus obtusis mucrone brevi terminatis, subcorniculatis. (Ligulæ infernè et in dorsi parte superiori pl. purpureo-brunneæ, supra tubum more Tolpidis barbatæ pl. pulchrè violaceæ, quod præter P. crystallinum in nullo alio observavi Picrido.)

Chondrilla tingitana floribus luteis, *Papaveris hortensis* folio. *Herm.*, *Lugdb.*, 657, t. 659.

Scorzonera tingitana. *Linn.*, *Sp. pl.*, ed. 1, p. 791, et ed. 2, p. 1114, et *Scorzonera orientalis*, *L. c.*, p. 1113.

Sonchus tingitanus *Papaveris* folio. *Tourn.*, *Inst.*, p. 474.

Sonchus tingitanus. *Lam.*, *Enc.*, 3, p. 397.

Picridium tingitanum. *Desf.*, *Atl.*, 2, p. 220. — *Buch, Canar.*, p. 147, et 175. — *DC., Pr.*, 7, p. 182, excl. loco natali «Siciliâ» sec. ipsiss. Gussone Fl. sic. syn., 2, p. 393.

Picridium arabicum. *Hochst!* et *Steud.* in *Schimp. pl. arab.*, n. 883 certè *P. tingitani* var. est integrifolia. Cl. Hochstetter ipse in litt. rectè monet : «Forsan *P. tingitani* var. *integrifolia* (semin anon »differunt).»

Picridium orientale. *DC., Pr.*, 7, p. 182 et verosimiliter *Picridium hispanicum*. *Poir.* — *DC., l. c.*

HAB. *Vulgaris* est in ins. Canariensibus : *Webb! Infierno Adexe, Fuente del Re Oro-tava Teneriffæ*. Specimina magna et pulchra in *Barranco de las Augustias* *Palmæ* sec. *Buch*, *l. c.*, p. 175. *Fuertaventura* : *Bourgeau!* n. 9.

Specimina canariensia sunt *palmaria spithamea*, *caulibus dichotome ramosis*, *erectis v. adscendentibus*, *foliis pinnatifidis*, *involuci squamis late albo-marginatis*, *inferioribus ad dorsi apicem corniculatis*.

DISTR. GEOGR. Stirps crat. mediterranei australis et Orientis, imò in Americam septentr. sec. specimen *pensylvanicum* herb. Zeyher! *introducta*, in hortis botanicis abundans.

In herbario habeo :

1. *Persia australis*. In fissuris rupium pr. pagum *Gere*, inter *Abuschir* et *Schiras*, 25 Mart. 1845 : *Kotschy!* pl. *Pers. austr.* ed. *Hohenaker* n. 28 et 87 (*P. orientale* *DC.* — *Boiss.!*). Planta caule humili submonocephalo, *sine capitulo* 5-5 poll. longo, esfoliato v. foliato, foliis integris v. pinnatifidis. — *Arabia*, in palmetis vallis *Fatme* prov. *arabicæ* *Hedschas* Febr. 1856 : *Schimpfer!* n. 853. Planta dodrantalis, ramosa, foliis integris v. superficialiter sinuat's. — *Barbaria* prope *Gerbi* et *Selecto*, vere anni 1846 : *Dr. Lorent!* Plantæ *palmares-spithameæ*, *subramosæ*, *foliis pinnatifido-pinnatipartitis*.

2. PICRIDIUM INTERMEDIUM. C. H. SCH. BIP.

P. annum; caule subfoliato, pl. inferne ramoso; pedicellis pl. plurisquamosis; squamis involuci inferioribus acutis v. acuminatis, margine scarioso angustiore sordidè viridi-albente munitis; foliis obovato-oblongo-lanceolatis, subintegris, crebre denticulatis,

denticulis spinescentibus; flore concolore dilute aureo vel superne dorso subpurpurascente.

Variat :

α Janii, caule 1-2-pedali, subefoliato, dichotome ramoso. Huc specimina sicula, cretensis, hispanica et lusitanica.
 β gracilis, caule spithameo, gracili, subefoliato, 1-2-cephalo. Huc specimina canariensis, 5-7 poll. longa, quibus
folia tenera, pleraque radicalia, rosulata, obovato-lanceolata, spinulose dentata, integra v. sinuata; caules graciles
1-5, erecti, 1-2-cephali; pedicelli squamosi, clavati; capitula parva, involuci squamæ inferiores dorsi apice corni-
culatæ, margine scarioso, albo-virente munitæ; flores pl. concolores, rarius dorsi ligulae parte superiore subpur-
purascentes. Species intermedia Picridium tingitanum inter et vulgare, priori radice annua affinis, sed inter alia
involuci squamis angustius et obscurius scariosis discrepans, posteriori magis affinis, sed diversa radice annua
squamis latius scariosis, flore pl. concolore in P. vulgari dorso ligularum livide villato.

Sonchus intermedius Cristofori et Jan! Catal., p. 13, gen. 658, sp. 6 1/2 (anno 1832).

HAB. In ins. Canariensis cum P. tingitano.

DISTR. GEOGR. Stirps mediterranea; habeo e Siciliâ : Jan! Cf. DC. pr. VII, p. 182, qui
stirpem hanc cum P. lingulato confundit; Cretâ : Sieber! cum P. vulgari; Lusitanâ in
arvis primo vere, Martio 1839 : Welwitsch! n. 388 (P. vulgare); Hispanâ in lutosis reg.
calidæ in monte Gibraltarico, 3 Apr. 1845 : Willkomm.! n. 570 (P. vulgare).

3. PICRIDIUM CRYSTALLINUM. C. H. SCH. BIP.

P. tingitanum β crispulum Webb! in litt.

HAB. In arenâ maris ad portulum oppiduli Guimar. Pili apice vesiculosi et tota planta
nicat veluti Mesembryanthemum crystallinum : Webb! in litt. Buena Vista, Teneriffæ :
Webb!

DISTR. GEOGR. Stirps canariensis.

Species peculiaris esse videtur. Capitula certe Picridio tingitano similia. Involuci squamæ nempe late albo-
scariosæ, ad dorsi apicem, exceptis intimis, corniculatæ, flores supra tubum pilosum violacei et ligula dorso sub-
purpurascens. Pedicelli in axi foliorum supremorum orientes, pollicares, efolioti, squama una alterave nota
cordata. Achænia nondum matura, attamen pappus basi in annulum concretus caducissimus.

Differet tamen a P. tingitano :

1. Radice fusiformi 3-4 poll. longa, superne 3-4 lin. diametro metiente, lignescente, pluricauli.
2. Caulibus cum capitulis speciosis tantum 2 poll. longis, inferne suffrutescentibus, 2-3 lin. diametro metientibus, ligno duro, amarissimo.
3. Foliis confertissimis innumeris, cæspitosis, linear-lanceolatis, pinnatipartitis, cum pinnis oblongis, dentibus
spinescentibus innumeris, inæqualibus conferte exasperatis, crispulis, et pilis simplicibus, apice in vesiculam
ovalem dilatatis, confertissimis, albo-cinereis. Corpusculi similes albentes, sessiles, ovales, inflati, etiam in foliis
P. tingitani et quandoque P. vulgaris sparsi observantur, quales in nullis aliis observavi Cichoriaceis, et quæ potius
ad regnum animale spectare videntur.

4. PICRIDIUM LIGULATUM. VENT.

P. infernè suffruticosum; squamis ovato-lanceolato-linearibus, obtusis, herbaceis, mar-