

Antheræ saturate purpureæ.

SEMINA unguicularia, teretia, lineis elevatis muricatis scabra.

Pappus plumosus.

SCORZONERA foliis radicalibus runcinatis, caule ramoso dichotomo subaphyllo. 13-14. *dichotoma.*
Lactuca flava; floribus ligulatis flavis. FORSK. Descr. pag. 143.

Legi Tuneti.

Affinis S. Picroidi, at diversa.

CAULES plures erecti, teretes, glabri, inferne striati, subaphylli, a basi ramosi: *rami* dichotomi, rigidi.

FOLIA pleraque radicalia, petiolata, dodrantalia, runcinata, glabra: lacinia lanceolata, dentato-angulata, pollicares, extrorsum majores, denticulis minutis albidis subciliata. *Caulina* sub binis primis ramificationibus, sessilia, structura radicalium: folia dein parva, lanceolata, sensim minora, ovata, integerrima, sub singulo ramo.

FLORES terminales, solitarii; *pedunculis* sub flore non incrassatis, squamosis; squamæ parum infra flores confertæ, ovata, margine membranaceæ, in calycem desinentes.

CALYX cylindricus, glaberrimus: *foliola* exteriora ovata, margine lato-membranacea, laxa; interiora linearia.

COROLLA flava, calyce longior.

PAPPUS pilosus, sessilis.

PICRIS.

PICRIS calycibus laxis, pedunculis subaphyllis, foliis elliptico-lanceolatis cauleque *aculeata.* strigoso aculeatis.

Hieracium echioides, capitulis cardui Benedicti, majus, arabicum, folio sinuato.

TOURNEF. Inst. pag. 470.

Picris calycibus simplicibus perianthio maximo obvallatis, foliis profunde sinuatis.

GRONOV. Fl. orient. n. 243.

Legi in montosis ad Zowan, urbem Tuncetanam, haud frequentem.

CAULIS erectus, pedalis, crassitie pennæ anserinæ, subramosus, striatus, adpersus totus spinulis parvis rigidis pungentibus.

FOLIA plurima radicalia, oblonga, in petiolum desinentia, bipollicaria & ultra, obtusa, dentato-sinuata, margine & in utraque pagina aculeis parvis numerosis inæqualibus albis adpersa. *Caulina* pauca, semiamplexicaulia, lanceolata, remota, dentata, aculeata uti inferiora, sesquipollicaria, sensim minora, rudimenta ramulorum in axillis.

PEDUNCULI versus summitatem, ramosi, hispidi, foliolo uno alterove spinuloso-ciliato.

CALYX calyculatus: *foliola* lineari-lanceolata, dorso spinuloso-ciliata.

SEMINA transversim substriata. Pappus pilosus.

Differt a Picr. echioides absentia Perianthii exterioris pentaphylli.