

morphologiquement, nous pensons que la distribution géographique pourra aider à élucider (ou à tenter d'élucider) sa phylogénie. Mais nous ne saurions faire intervenir la distribution géographique dans les questions diagnostiques. Nous croyons d'ailleurs que c'est dans ce sens modéré qu'il faut comprendre les idées ingénieuses émises par M. de Wettstein dans son livre sur la méthode morphologico-géographique (*Grundzüge der geographisch-morphologischen Methode der Pflanzensystematik*, Iena, 1898). Il était dans la nature des choses de voir dans la suite des disciples zélés leur donner une application qui dépasse le but. Nous aurions encore plusieurs autres points à relever dans la critique de M. v. Hayek (relativement aux *C. Jacea*, *Scabiosa* et *montana*), sans que cette discussion, qui touche à des questions de principes, puisse avoir grand résultat actuellement. Bornons-nous à mentionner encore que Schleicher n'a jamais signalé un *C. tenuifolia*, mais un *C. scabiosa* var. *tenuifolia*. C'est M. v. Hayek qui doit être cité comme auteur de cette dénomination, avec la date 1901. — Dr J. Briquet in sched.

*Picris hieracioides* L. var. *alpestris* Arv.-Touv. et Briq. Nouv. Notes flor. Alp. Lem. 1899. Osnago, val Colla.

*Picris angustissima* Arv.-Touv., sp. nov. Locarno, terrains vagues. Plante très rude à *feuilles* très étroites, linéaires (2-3 mm. large), les basilaires atténuées en pétioles et un peu élargies supérieurement; *capitules* assez petits à péricline non étranglé, à ligules uniformément d'un beau jaune non pourprés en dehors; *akènes* d'un bai brun, très petits (2 1/2 mm.) très finement rugueux transversalement (Arvet-Touvet in sched.). — M. Arvet-Touvet avait déjà reçu cette plante de Caillac près Guillestre, Hautes-Alpes.

*Hieracium Pilosella* L. ssp. *ermineum* N.P. Prairies au-dessus de Villa, près Sonvico.

*Hieracium hypeurium* N.P. ssp. *lamprocomum* N.P. Monti, val Canaria, c. 1850 m.; près Novaggio, Malcantone.

*Hieracium niphobium* N.P. ssp. *niphostribes* N.P. Passo Bornengo, val Canaria (coll. J. Braun).

*Hieracium niphobium* ssp. *capillatum* N.P. Du Passo Quadrella au Madone, val Bosco, 2230-2500 m.; Passo Bornengo, val Canaria c. 2200 m. (coll. J. Braun).

*Hieracium cymosum* L. ssp. *sabinum* (Seb. Maur) N.P. Prés à Fusio (hb. Frz.); Osasco, v. Bedretto (Dlle Ciossi).

*Hieracium densicapillum* N.P. ssp. *Laggeri* Sch. bip. Au-dessus de Bosco.

*Hieracium scorzonerifolium* Vill. ssp. *flexuosum* W. K. Denti della Vecchia, dans la gorge.

*Hieracium villosum* L. ssp. *villosum* N.P. Marchenspitz sur Bosco; Piz Fongio.

*Hieracium leucochlorum* Arv.-Touv. Sur Bosco. (coll. S. Aubert).

*Hieracium alpinum* ssp. *melanocephalum* N.P. Du Passo di Quadrella au Madone, val Bosco, 2230-2500 m.; Passo Bornengo, v. Canaria c. 2600 m. (coll. J. Braun).