

pour abandonner un nom, du reste, peu convenable pour le *S. plantaginea* qui atteint près d'un mètre de hauteur dans certaines circonstances,

1407. S. Hispanica. L. sp. 1112. (S. d'Espagne.) — Racine longue à écorce noire, à collet garni d'écaillés; tige de 6 à 8 déc. glabre ou parsemée de flocons blancs laineux, rameuse et pluriflore, feuillée; feuilles oblongues ou lancéolées acuminées, les radicales rétrécies en pétiole embrassant la tige, les supérieures sessiles amplexicaules plus ou moins denticulées; folioles extérieures de l'involucre triangulaires, ovales aiguës; fruits extérieurs légèrement muriqués. Fleurs jaunes. Juin, juillet 2. Cultivée abondamment autour des villes, pour ses racines alimentaires.

1408. S. glastifolia. Wild. Sp. 1499. (S. à feuilles entières.) *S. asphodeloides* Wallr. — Très ressemblante à l'*hispanica*, mais plus grêle dans toutes ses parties; feuilles très entières linéaires lancéolées longuement acuminées en pointe fine, les supérieures très étroites; pédoncules grêles, presque nus, très allongés; anthodes un peu plus petits. Lieux secs. RR. — CHER. Bords des bois à St-Loup et Chavannes. (Saul).

335. PICRIS. L. (Picride) Involucre imbriqué, à écaillés extérieures plus petites étalées; réceptacle alvéolé sans paillettes; fruits striés en travers, contractés ou atténués au sommet; aigrette caduque, presque sessile, à poils plumeux un peu élargis à la base, et soudés en anneau.

1409. P. Hieracioïdes. L. sp. 1115. (P. Epervière.) — Tige de 4 à 9 déc. droite, anguleuse striée à rameaux divergents, hérissée de poils rudes; feuilles hispides, rudes, oblongues lancéolées, dentées ou sinuées, à base élargie amplexicaule, les radicales pétiolées, rétrécies en long pétiole; rameaux floraux étalés axillaires, alternes, en corymbe irrégulier; involucre à écaillés lancéolées acuminées, hispides et un peu farineuses, d'un vert foncé; ligules jaunes violacées en dessous; fruits bruns briquetés. Juillet, octobre ②. Lieux incultes et pierreux, champs, vignes. C.

1410. P. arvalis. Jord.! (P. des champs.) — Tige de 5 à 9 déc. droite, anguleuse striée, hérissée de poils rudes, à rameaux un peu étalés; feuilles hispides, rudes oblongues lancéolées dentées ou sinuées, les inférieures rétrécies en long pétiole, les autres sessiles à base élargie embrassante; rameaux floraux rudes, un peu étalés, naissant à un point commun, en fausse ombelle; involucre à écaillés lancéolées acuminées, hérissées de poils blanchâtres, ligules jaunes, violacées en dessous, fruits un peu courbés brun-rougeâtres. Août, octobre ②. Champs et broussailles. — CHER. Trouy, Mehun, bois de Rouet (Déséglise).

1411. P. erepoïdes. Sauter. (P. crépide.) *P. pyrenaica* L.? Gren. et Godr.! Fl. fr. 2, p. 303. — Robuste, tige de 4 à 7 déc. droite, hispide; feuilles larges très hérissées, les supérieures ovales lancéolées, embrassant la tige par une base arrondie, les inférieures rétrécies en pétiole ailé embrassant à la base, pédoncules courts, un peu épaissis, en corymbe irrégulier, anthodes plus gros, involucre à écaillés noirâtres hispides, toutes dressées, fruit bien plus gros que dans les précédentes; fleurs jaunes. Juillet, août ②. Lieux pierreux des montagnes. R. — Mont-Dore.