

rieures détruites en partie au moment de l'anthèse et ne formant pas une rosette plus ou moins fournie et régulière, la tige bien plus abondamment feuillée, à villosité plus longue et plus étalée, la panicule ordinairement étroite, appauvrie, les réceptacles munis de larges soies fibrilleuses et aussi de quelques poils courts, etc. Cette forme paraît exister dans une grande partie des Pyrénées (*Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales*).

Obs. — Puisque j'ai l'occasion de parler d'un *Hieracium* élevé au rang d'espèce par M. Arvet-Touvet, je répéterai ce que j'ai déjà imprimé dans les *Illustrationes plantarum Europæ rariorum* (fasc. II, p. 13, t. 39) que le *Hieracium Baticum* Arv.-Touv. et Reverchon *ap. Hervier Sur quelques plantes d'Espagne*, in *Revue générale de Botanique*, 4 (1892), p. 154, et *ap. Arv. Touv. et Gautier, l. c.* (1894), p. 331, est synonyme de l'*H. Mariolense* Rouy *Excurs. bot. Esp.*, 1879, pars 2, p. 15. Sont également synonymes de ce même *H. Mariolense* Rouy les *H. Aragonense* Porta *Veget.*, p. 44, non Scheele, et *H. purpurascens* Porta *Veget.*, p. 45, non Scheele.

→ **Pycris Pyrenaica** L. — Cette espèce nécessite quelques observations.

1° Linné a décrit, dans le *Species* (éd. 1), le *Picris Pyrenaica* comme variété de son *Hieracium Pyrenaicum*; donc le nom de *H. Pyrenaicum* Jord. (*Observ.*, fragm. 7, p. 37) tombe dans la synonymie. Je propose, pour ne pas changer l'éthymologie, le nom de **H. Pyrenæum** Rouy (*H. Pyrenæum* Jord, non L.)

2° Linné attribue à sa plante, qu'il cite seulement dans les Pyrénées, des feuilles sinuées-dentées (« *foliis dentato-sinuatis* »); il y a lieu dès lors de donner un nom à la plante des Basses-Pyrénées, où elle est d'ailleurs rare, qui présente des *feuilles toutes entières, lancéolées, très allongées* (les radicales assez semblables à celles du *Pulmonaria longifolia* Bast.), et qui offre, en outre, des *fleurs grandes, portées par des pédicelles relativement courts, gros, insensiblement épaissis de la base au sommet*. Je nomme ce *Picris*: **P. Benearnensis**.

3° Le véritable *P. Pyrenaica* L. est également distinct du *P. crepoides* Saut. bien que plusieurs auteurs considèrent les

deux plantes comme synonymes et le *P. crepoides*, de Sauter, n'est pas la plante que Koch a rattachée comme var. *crepoides* au *P. hieracioides* L. Je crois utile d'essayer, dans le tableau dichotomique suivant, de débrouiller ce petit chaos en donnant les caractères de ces diverses plantes.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | } | Pédicelles courts, gros, fistuleux, insensiblement épaissis de la base au sommet et ayant 3-4 millim. de diamètre sous la calathide; fleurs grandes ou très grandes; plantes très hispides vers le haut..... 2. |
| | | Pédicelles \pm allongés, souvent très longs, plus grêles, épaissis seulement vers la calathide (parfois même assez peu) et ayant 1-2 millim. de diam. au sommet..... 3. |
| 2 | } | Feuilles toutes entières, lancéolées, très allongées (les radicales et les caulinaires inférieures ayant de 2 à 3 décim.), planes aux bords; plante brièvement rameuse, seulement dans le tiers ou le quart supérieur..... P. BENBARNENSIS ROUY |
| | | Feuilles toutes fortement sinuées-dentées, ondulées aux bords, relativement courtes (les radicales et les caulinaires inférieures ayant de 8 à 12 centim.); plante ordinairement très rameuse dès le tiers inférieur..... P. PYRENAICA L. |
| 3 | } | Feuilles caulinaires moyennes ovales-lancéolées, largement amplexicaules..... 4. |
| | | Feuilles caulinaires moyennes étroitement lancéolées, arrondies ou à peine amplexicaules..... 5. |
| 4 | } | Plante robuste, de 5-6 décim., très rameuse; feuilles grandes (8-12 cent.), fortement dentées..... P. AURICULATA Schultz Bip. |
| | | Plante plus grêle (2-4 décim.), peu rameuse; feuilles médiocres (3-6 centim.), sinuées-denticulées..... P. CRINITA Reut. |
| 5 | } | Pédicelles munis de poils blanchâtres courts, feutrés, qui les rendent subtomenteux..... 6. |
| | | Pédicelles dépourvus de poils feutrés et nullement subtomenteux, fortement hispides, \pm noirâtres..... 9. |
| 6 | } | Pédicelle et involucre non ou faiblement hispides..... 7. |
| | | Pédicelle et involucre nettement hispides un peu épaissis sous la calathide..... 8. |
| 7 | } | Pédicelles assez fortement épaissis sous la calathide; feuilles dentées, lancéolées-acuminées, très aiguës..... P. CREPOIDES Saut. |
| | | Pédicelles non ou à peine épaissis sous la calathide; feuilles lancéolées, les radicales obtusiuscules-mucronées, subentières..... |
| 8 | } | P. VILLARSI Jord. |
| | | Tige robuste; feuilles grandes, lancéolées, subentières..... P. OROPHILA Timb. |
| | | Tige grêle; feuilles très allongées, linéaires..... P. FLAGELLARIS Timb. |

