

que tiene la *V. serpilifolia*, y las cápsulas maduras están algo menos escotadas que en el tipo.

Dedicada respetuosamente a D. Ignacio Bolívar.

### ***Picris bracteatus* sp. nov. ?**

Planta probablemente perenne, de más de 50 cm. de alta, poco ramificada y provisto el tallo de abundantes pelos ásperos; hojas inferiores de 15 cm., lanceolado-oblongas, estrechadas en pecíolo, roído-dentadas o festoneadas en los bordes, pero no ondeadas; las caulinares, lanceolado-lineales, enteras y no amplexicaules, todas provistas en las dos caras de pelos ásperos; cabezuelos sobre pedúnculos bastante largos, que tienen muchas brácteas foliares; brácteas del involucreo agudas y provistas en el dorso de gruesas cerdas negras.

Recogida en la jurisdicción del pueblo de Berberana de Losa (Burgos) en sitios húmedos, en el mes de julio de 1928.

Del *Picris hieracoides* L. difiere por no tener las hojas caulinares amplexicaules. Del *P. longifolia* B. et R. se distingue por tener las hojas radicales menores y las caulinares más estrechas, casi lineales; las cabezuelas van sobre pedúnculos largos y siempre en mayor número y en cima mucho más clara que en éste. Por sus caracteres, esta planta se parece al *P. longifolia* B. et R., pero por su porte es mucho más parecida al *P. hieracoides* L.; por tratarse de un grupo de plantas muy polimorfo y por haber sido sólo tres los ejemplares recogidos (por creerlo *P. hieracoides* que es por aquí abundante), habrá que esperar a ver si se le encuentra en más sitios antes de decir si se trata de una especie nueva o es sólo una forma interesante, intermedia entre las especies *hieracoides* y *longifolia*.

Muy agradecido de D. Carlos Pau, que me revisó las especies cogidas por mí este año y me indicó las diferencias que separaban de los tipos a dos de las plantas aquí descritas.