

cymbiformi paulò breviori terminatis, acheniis interioribus longiusculè attenuato-scabridis.

Hab. in Palæstinâ Arabiæ conterminâ ad meridiem urbis *Gaza*.  
(Boiss.)

A. præcedenti distinctissima caulibus diffusis aliisque notis in dia-  
gnosi enumeratis.

**PICRIS CAMPYLOCARPA** Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect.  
*Eupicris*.)

P. biennis tota infernè longius supernè brevissimè et tenuiter setu-  
loso-glochidiata asperula, caule erecto elato infernè folioso supernè  
dichotomè ramosissimo, foliis oblongo-spathulatis infimis basi atte-  
nuatâ pinnatilobatis lobis parvis obtusis, intermediis sessilibus basi  
obscure auriculatis repando-sinuatis subintegris, summis linearibus  
pedunculis nudis vel 1-2 squamulis obsitis capitula multò superantibus,  
involucri phyllis glaucescenti-livescentibus ad medium puberulis fari-  
naceis ad marginem membranaceis non setosis, exterioribus triangularibus  
interioribus linearibus acutis, ligulis concoloribus involucro  
duplò longioribus, acheniis brevibus angulatis transversè valdè rugu-  
losis valdè incurvis basi subattenuatis supernè in rostrum eis dimidiò  
brevius angustatis, pappo omnium conformi niveo achenio longiori.

Hab. in collo saxoso aprico propè *Kourmalu* Pamphyliæ ad radices  
montis *limax* Fl. Maio. (Held.)

Planta bipedalis, flores illis *P. hieracioidis* majores, achenia cum  
rostro 2 1/2 lin. longa; ab eâ et cæteris speciebus generis distinctis-  
sima acheniis brevibus et valdè incurvis.

**PICRIS CYANOCARPA** Boiss.

P. annua tota setulis albis brevibus apice glochidiatis densiusculè  
canescens aspera, foliis radicalibus oblongis basi attenuatis pinnati-  
lobatis runcinatis vel sinuato-repandis brevibus, caulibus scapiformi-  
bus ascendentibus pumilis simplicibus vel bifidis bicephalis folio cau-  
lino uno alterutrore angustè linearí donatis, pedunculo parcè squamu-  
loso, involucri phyllis exterioribus paucis linearibus interioribus linea-  
ribus acuminatis farinaceo-puberulis prætereaque dorso albo-setosis,  
ligulis concoloribus involucro duplò longioribus, acheniis omnibus  
conformibus cyaneo-glaucescentibus transversè valdè rugosis in ros-