

*Picris crinita*, Reut. cat. Jord. Genève 1856. P. biennis, caule stricto apice corymboso foliisque pilis furcatis simplicibusque hirsuto; foliis lanceolatis subregulariter repando-dentatis radicalibus inferioribusque basi longè attenuatis, caulinis mediis sessilibus vel semiamplexicaulibus superioribus integris; pedunculis apice subincrassatis involucrisque pilis longis atris hirsutis; capitulis e majoribus generis, involucri nigricantis squamis oblongo-linearibus exterioribus laxis brevibus omnibus pilis longis crinitis hirsutis, ligulis concoloribus aureis, achæniis leviter incurvis utrinque subangustatis tenuissime transversè rugosis castaneo-fuscis. — Hab in herbosis montis *La Grigna* supra lacum Comensem, et in monte Viso Delphinatus. — Affinis *P. Villarsii* et *crepoidi*, prior differt foliis augustioribus minus regulariter dentatis, capitulis minoribus subumbellatis, involucris minùs hirsutis; posterior foliis latioribus grossè dentatis hispido-setulosis basi latè amplexicaulibus, involucri squamis latioribus exterioribus ovato-lanceolatis subimbricatis.

*P. Villarsii*, Jord. ! Cat. Jord. Dij. 1848.

Elle croît dans les prés des montagnes, dans les Alpes, en Valais, dans la vallée de Bagnes! vallée de Conche (M. le docteur Lager), au Mont-Méri, au-dessus du Reposoir! dans le Jura, au vallon d'Ardran! en Dauphiné, Mont-Viso, etc.; et enfin, M. le curé Chavin l'a trouvée dans les prés, à Compesières, où elle est commune. Elle fleurit dans les Alpes en Juillet, Août, et en Juin dans la plaine. *P. Pyrenaica*, Vill. an L.? *P. pyrenaica* var.  $\beta$  Gren. et Godr.

Espèce bien distincte de la précédente et de la suivante par son indument beaucoup moins rude, plus fin et plus serré, ses feuilles plus étroites, entières ou légèrement dentées, presque planes, ses capitules moins nombreux, en corymbe lâche ou en ombelle, ses involucre fructi-