

cymbiformi paulò breviori terminatis, acheniis interioribus longiusculè attenuato-scabridis.

Hab. in Palæstinâ Arabiæ conterminâ ad meridiem urbis *Gaza*.
(Boiss.)

A. præcedenti distinctissima caulibus diffusis aliisque notis in dia-
gnosi enumeratis.

PICRIS CAMPYLOCARPA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect.
Eupicris.)

P. biennis tota infernè longius supernè brevissimè et tenuiter setu-
loso-glochidiata asperula, caule erecto elato infernè folioso supernè
dichotomè ramosissimo, foliis oblongo-spathulatis infimis basi atte-
nuatâ pinnatilobatis lobis parvis obtusis, intermediis sessilibus basi
obscure auriculatis repando-sinuatis subintegris, summis linearibus
pedunculis nudis vel 1-2 squamulis obsitis capitula multò superantibus,
involucri phyllis glaucescenti-livescentibus ad medium puberulis fari-
naceis ad marginem membranaceis non setosis, exterioribus triangularibus
interioribus linearibus acutis, ligulis concoloribus involucro
duplò longioribus, acheniis brevibus angulatis transversè valdè rugo-
losis valdè incurvis basi subattenuatis supernè in rostrum eis dimidiò
brevius angustatis, pappo omnium conformi niveo achenio longiori.

Hab. in collo saxoso aprico propè *Kourmalu* Pamphyliæ ad radices
montis *limax* Fl. Maio. (Held.)

Planta bipedalis, flores illis *P. hieracioidis* majores, achenia cum
rostro 2 1/2 lin. longa; ab eâ et cæteris speciebus generis distinctis-
sima acheniis brevibus et valdè incurvis.

PICRIS CYANOCARPA Boiss.

P. annua tota setulis albis brevibus apice glochidiatis densiusculè
canescens aspera, foliis radicalibus oblongis basi attenuatis pinnati-
lobatis runcinatis vel sinuato-repandis brevibus, caulibus scapiformi-
bus ascendentibus pumilis simplicibus vel bifidis bicephalis folio cau-
lino uno alterutrove angustè linearí donatis, pedunculo parcè squamu-
loso, involucri phyllis exterioribus paucis linearibus interioribus linea-
ribus acuminatis farinaceo-puberulis prætereaque dorso albo-setosis,
ligulis concoloribus involucro duplò longioribus, acheniis omnibus
conformibus cyaneo-glaucescentibus transversè valdè rugosis in ros-

trum tenue eis longius attenuatis, omnium pappo plumoso achenio-æquilongo.

Hab. in valle *Mokatteb* Arabiæ Petreæ aliisque deserti locis. (Boiss.) Huc quoque spectare videtur Aucher № 3411 e *Persia australi* ob flores nondūm evolutos subincertum.

Folia pollicem aut amplius longa, caules 3-6 pollicares, capitula eis *P. paucifloræ* majora; species acheniis longè rostratis insignis hāc notā ad *P. longirostrem* Schultz tantūm accedens quæ foliis angustè linearibus, caulibus divaricatim ramosissimis, pedunculis apice in-crassatis, acheniis rufescentibus etc. discedit.

MILLINA ARABICA Boiss.

M. annua, foliis omnibus radicalibus rosulatis densè et breviter setulosis griseis linearibus pinnatipartitis segmentis brevibus angustè linear-lanceolatis, scapis procumbentibus vel ascendentibus foliis 2-3 plò longioribus simplicibus vel bicephalis, involuci squamis adpressè imbricatis ab extimis ad intimas lineares sensim elongatis farinoso-puberulis apice nigricantibus, ligulis concoloribus disco sesquilongioribus, acheniis rectis tenuissimè cylindricis sulcatis transversè tenuiter rugulosis rostro setaceo acheniorum marginalium paulò breviori centralium æquilongo terminatis, pappi rostro æquilongi setis 10 basi paleaceo-dilatatis supernè plumosis plumis deciduis.

Hab. in *rabiā petræā* ad fines Palæstinæ cum *M. hispidulā*, legi vere 1846.

Habitus et folia *Picridis radicatæ* Lessing. A *M. hispidulā* eximiè differt foliis abbreviatis angustè linearibus, lobis brevioribus magis æqualibus, indumento griseo setuloso, involuci phyllis regulariùs imbricatis, acheniis abruptiùs et tenuiùs nec sensim in rostrum attenuatis, pappo achenio breviori nec æquilongo.

Pro *Millinā Persicā* Boiss. in Diagn. VII p. I lege **MILLINA HISPIDULA** Boiss. var. *tenuiloba*. Hanc plantam ex speciminibus in Arabiā petreā et Ægypto lectis agnosco pro formâ *Crepidis hispidulæ* Del. Æg. tab. 42 fig. I. — *Oporiniae hispidulæ* DC. quæ foliis plus minus incisis ludit. Hæc species omnibus characteribus et in primis acheniis evidenter et longè in rostrum attenuatis *Millinæ* nec *Crepidii* vel *Oporiniae* adnumeranda est, inter *Millinæ* sectiones intermedia et eas optimè conjungens.