

915. PICRIS.

4. (post 2). *P. PAUCIFLORA*: caule erecto hirto, foliis lanceolatis sessilibus denticulatis, pedunculis elongatis incrassatis, calyce hirto. *Decand. fl. fr.*
Hab. in Gall. austr. 4? *D. intr.* 1818. — An ab *Hier. pappoleuco* diversa?
5. (1-3). *P. DAVURICA Fisch.*: caule erecto hispido, foliis lineari-lanceolatis subdenticulatis hispidis, calyce exteriori laxo.
Hab. in Imper. Ruthen. ♂. *D. intr.* 1818.

917. HIERACIUM.

73. (27-28). *H. CRASSIFOLIUM Bernhardi*: caule erecto corymboso-paniculato, foliis lineari-lanceolatis denticulatis glabris.
Hab. — — 4. *D. intr.* 1817. Differt ab *H. saxatile* caule foliosiore, dentibus foliorum minoribus et denique ramificatione.
74. (29-30). *H. LONGIFOLIUM*: caule erecto ramoso, foliis lanceolatis calycibusque lanatis, radicalibus basi elongatis.
Hab. — — 4. *D. intr.* 1817. ex hort. *Berolin.* sub hoc nomine.

918. CREPIS.

27. (20-21). *C. VIRENS*: foliis glabris, inferioribus remote dentatis, superioribus subintegerrimis subsagittatis, caule basi ramoso diffuso; calycibus pubescentibus. *W. Sp.*
Hab. in Helvet., Gallia, Italia. ☉. *D. intr.* 1817.

925 b. KRIGIA.

Recept. nudum. *Cal.* polyphyllus simplex. *Papp.* membranaceus 5-phyllus cum setis 5-intermixtis alternis.

1. *R. VIRGINICA W. Sp.*

Hab. in Virginia, Pensylvan. ☉. *F. intr.* 1818.