

Chine, Kouy-tchéou ; bords du Hoa-kiang. Rare.

L. Martin legit, 17 février 1899. Herbar Bodinier, n° 2567.

***Picris divaricata* sp. n.**

Racine épaisse ; tige dressée, striée, hérissée, surtout dans le bas, de poils fourchus au sommet ; donnant naissance à des rameaux raides, divariqués, les inférieurs presque horizontaux, d'où une inflorescence en corymbe diffus ;

Feuilles inférieures nombreuses, serrées sur la base de la tige, ovales-oblongues, atténuées en pétioles, ondulées-dentées, obtuses au sommet, vertes, alternes, ciliées, hérissées sur la page et surtout la nervure inférieures ; feuilles caulinaires rares, sessiles, étroites, dentées, se changeant en bractées à la base des rameaux supérieurs, ciliées, hérissées ;

Capitules assez gros, 1-2 à l'extrémité des rameaux, ligulés ; involucre à folioles hérissées ;

Fleurs jaunes, nombreuses ; aigrette plumeuse, blanche, égalant l'involucre, aussi longue que l'akène ; celui-ci roux, courbé, élargi au milieu, s'atténuant au sommet, à côtes transversalement striées.

Diagnose latine.

Radix spissa ; caulis rectus, striatus, ad basim praecipue pilis furcillatis hirsutus, promittens ramos rigidos divaricatos, inferiores fere horizontales, corymbun diffusum efformantes ;

Folia inferiora multa, ad imum caulem spissa, ovato-oblonga, in petiolum attenuata, undulato-dentata, ad apicem obtusa, viridia, alterna, ciliata ; in pagina inferiori maxime ad nervum hirsuta ; caulina pauca, sessilia, angusta, dentata, evadentia in bracteas ad ramorum superiorum basim, ciliata, hispida ;

Capitula mediocria, singula vel bina ad apicem ramorum, ligulata ; involucreum phyllis hispidis ;

Flores lutei, multi ; pappus plumosus, albus, involucreum aequans, par akenio rufo, curvo, ad medium dilatato, ad apicem attenuato, costis transversum striatis.

Diffère du *P. hieracioides* par sa forme, sa tige et ses rameaux moins hispides, ses feuilles caulinaires moins nombreuses.

Chine, environs de Yun-nan-sen.

Abonde dans la plaine sur le bord des canaux, rizières, champs (Note du collecteur).

E. Bodinier legit, 24 mars 1897. Herbar Bodinier, sans n°.

Un autre échantillon, de la même localité, mais recueilli en novembre 1896, semble être un individu de la même espèce, mais moins développé.

Egalement sans numéro.

Leveillea GENUS NOVUM.

Capitula homogana, *tubiliflora*, violacea;

Involucrum *subhemisphaericum*, phyllis pluriseriatis, externis brevibus sat latis, mediis paulo angustioribus, internis angustis elongatis, universis ad margines ciliatis, medio villosis, aliquantum acuminatis, macula rubra ad acumen;

Receptaculum *planum*, *vellere spisso albo akenia abdente onustum*;

Corollae circuitus tubulo angustissimo; corollae disci latiores, limbo campanulato ad apicem bilabiato breviter et anguste hiante, pilis albis ad normam apicis aucto; antherae...? Stylus *inclusus*, bifidus, *ramis linearibus approximatis*;

Akenia plurima, minima, nigra, hispida, *pappo coronata*; *pappus setis simplicibus albis, akenio quadruplo longioribus*: earum copia flosculos quasi demersos continente, et ad primum intuitum sola secus capitulorum convexitatem apparente;

Capitules homogames, *tubuliflores*, violets;

Involucre *subhémisphérique*, à folioles plurisériées, les extérieures courtes, assez larges, les moyennes un peu plus étroites, les intérieures étroites allongées; toutes ciliées aux bords, velues au milieu, un peu acuminées, tachées de rouge au sommet.

Réceptacle *plan*, chargé d'une épaisse toison blanche qui cache les akènes:

Corolles du bord à tube très étroit; corolles du centre plus larges, à limbe campanulé, bilabié au sommet, ouvert étroitement et brièvement couronné d'une houppe de poils blancs; anthers...? style *inclus*, bifide, à *rameaux linéaires, rapprochés*;

Akènes très nombreux, petits, noirs, velus, *couronnés d'une aigrette*; aigrette formée de poils simples, blancs, quatre fois plus longs que l'akène; leur abondance noyant pour ainsi dire