

PICRIS GRACILIS Jord.

P. pedunculis subcorymbosis, involuci subcanescens pilis glochidiatis parcè obsiti demùm in medio constricti foliolis lanceolatis obtusis, exterioribus subpatulis, ligulis *subtūs concoloribus*, akeniis fuscis transversè rugoso-striatis, foliis viridibus utrinquè *pubescentibus parùm asperis*, radicalibus caulinisque imis in petiolum angustatis *linearis-lanceolatis* acutis *breviter sinuato-dentatis*, dentibus *ovatis lanceolatisve* acutis patulis, caulinis plerisque semi-amplexicaulibus, superioribus præsertim parcè dentatis abbreviatis, caule *gracili* leviter striato *breviter et tenuiter hispido parùm aspero* erecto supernè ramis erecto-patulis paucifloris aucto, radice bienni vel perennante.

Hab. in nemorosis siccis Delphinatûs propè Briançon, ubi eam adhuc florentem 30 aug. anni 1842 et 31 aug. anni 1851 ipse copiosè legi.

Habitu medium ferè tenet inter *P. hieracioidem* L. et *P. Villarsii* Jord. in Cat. Dijon 1848; sed his duobus valdè gracilior est.

A *P. Villarsii* recedit florescentiâ seriore, foliis angustioribus, involucris floribusque siccitate immutatis nec fuscescentibus.

A *P. hieracioide* differt præsertim pubescentiâ omnium partium valdè tenui et abbreviatâ parùm asperâ, ut in *P. Villarsii*.

— A *P. crepoide* Saut. quæ pedunculis incrassatis, capitulis involucrisque majoribus, hispiditate valdè longiore et habitu robustiore prædicta est, multò longius discrepat.

TARAXACUM AFFINE Jord.

T. capitulis terminalibus solitariis, involuci basi *obconici* foliolis viridibus sub apice ferè ecarinatis, exterioribus brevioribus