

Die hier zusammengezogenen Arten stellen eine fließende Übergangsreihe dar, deren Extreme, der *G. Delavayi*-Typus und *G. uncinata*, nur vom Standort abhängig sind.

* *G. nivea* (WALL.) Schtz. bip. in Flora, XXVII., 780 (1844) (*Oreoseris?* n. [Wall.] DC., Prodr., VII., 18 [1838]). NW-Y.: Bei Lidjiang, VI.—IX. 1914—1916, v. E. (3622). Hier in Kieferwäldern unter dem kleinen Gletscher des Yülung-schan, 3300 m, 17. VIII. 1914 (SCHNEIDER 2277) und auf Alpenmatten, 3800 m (SCHN. 3257).

Lapsana L.

(*Lampsana* SCOP.)

L. apogonoides MAX. H.: Massenhaft im Sand am Flusse und in Reisfeldern der str. St. bei Tschangscha, Sandstein, 25—50 m (11521). NE-Y.: Kanalränder der wtp. St. bei Dungschan, 2500 m (MAIRE).

Picris L.

P. hieracioides L. subsp. *japonica* (THBG.) HAND.-MZT. (*P. japonica* THBG., Fl. Jap., 299 [1784]. — *P. hieracioides* L. var. *j.* [THBG.] DIELS in Bot. Jahrb., XXIX., 630 [1900]. — *P. Mairei* LÉVL. in Bull. Ac. Géogr. Bot., XXV., 14 [1915], e typo). SW-H.: Buschwiesen der wtp. St. auf dem Yün-schan bei Wukang, 1400 m, Tonschiefer (12152). W-Hubei: Djienschi (WILSON, Veitch Exp. 1296). NE-Y.: Kanalränder der Ebene von Dungschan, 2500 m (MAIRE). Matten hier (M., distr. BONATI 7327).

Die von KOMAROW in Act. Hort. Petrop., XXV., 767 (1907) angegebenen Unterschiede in Pappus und Blattzählung sind nicht vorhanden. Es bleibt nur die stärkere Behaarung, die der Pflanze analog der Bewertung der europäischen Formen Subspeziesrang gibt.

— — ** subsp. *fuscipilosa* HAND.-MZT.

Planta magna, robusta, polycephala, praesertim superne inclusis involucris necnon inferne pilis longissimis fuscis plurimis eglochidiatis dense hirsuta, foliis superioribus basi lata amplexicaulibus, pedicellis sub calathiis incrassatis, involucris 15—17 mm longis, atris, floribus (e nota ad vivum) flavis.

Trockene und üppige Waldwiesen, offene Wälder und kräuterreiche Hänge der tp. bis in die ktp. St., 2950—3900 m. NW-Y.: Bei Lidjiang gegen das Beschui, 18. VII. 1914 (4189). Hier am Osthang des Yülung-schan, V.—X. 1922 (ROCK 5688, Typus) und an seiner NW-Seite, VIII. 1922 (FORREST 23128). Auf dem Patü-la und unter dem Paß Schulakadsa, 16. VIII. 1915 (7672), an der Westseite des Gebirges Piepun, 12. VIII. 1914 (4788) und ganze Wiesen gelb färbend bei Tomulang se von Dschungdien. S.: Sattel s Lidjia-tsun zwischen Muli und Yungning (phot.). Im NW auf Gebirgen um Sungpan (WEIGOLD?, mangelhaft).

Am ähnlichsten der ssp. *kamtschatica* (LEDEB.) HULTÉN in Kgl. Sv. Ak. Handl., 3. ser., VIII/2., 217 (1930), die sich durch fast ausnahmslos widerhakige Haare und breitere, aber am Grund nicht verbreiterte Blätter unterscheidet. Alle europäischen Formen haben viel kleinere Körbe.

P. divaricata VANT., e typo. Matten, Wegränder, Äcker, trockene Gebüsche und Föhrenwälder der wtp. bis in die tp. St., vielleicht nicht auf Kalk, 1800 bis