

dv o j í; vnitřní [f] s pérovitým chmýřím, obvodové [f<sub>1</sub>] s roz-  
třepenou korunkou. — Čc - sp. Merid., u nás znám pouze z luk  
u Otradic blíže Náměště v Brněnsku . . . . .  
srstnatý - hirta ROTH.\*) [955].

Rod 17. Hořčík. **Picris**. Bitterkraut.

Byl. 2letá i vytrv., 5-10 dm vys., listnatá, nahore v cho-  
choličnatou latu rozvětvená, porostlá draslavými, většinou  
háčkovitými, bílými chlupy. L. chobotnatě zubaté až skoro  
celokrajné, dolejší v řapík zúžené, vyšší poloobjímavé. Žluto-  
květé úbory mají střechovitý zákrov a bezplevné lůžko. Bez-  
zobanné nažky jsou věnčeny pernatým chmýřím [f],  
které jest na spodu rostlo v kroužek a záhy v celo-  
stí opadává [t<sub>1</sub>]. — Čc.-zř. Euras., na suchých, travn.  
stráních a u cest porůznu . . . . .  
jestřábníkovitý - hieracioides L. [956].

Pozn. Na Tatrách roste odr. (subsp.) s l. širokými, vejčitými, u spodiny  
široce srdčitými, s černavým zákrovem a většími úbory

tatranský — *P. Tatrae* BORBÁS.

Roztroušeně roste odr. (subsp.) s l. dosti malými, roztroušeně štětinatými, jenom  
mírně drsnými; vnější l. zákř. jsou vzpřímeny, elliptické neb vejčité elliptické, vnitřní  
černě štětinaté; (u typu jsou stopky květní posázeny světlými štětínami). Lod. bývá  
chudoúborná . . . . . šupinatý — *paleacea* VEST.



956. *Picris hieracioides*.



957. *Helminthia echioides*.

Rod 18. Draslavec. **Helminthia**. Wurmlattich.

Byl. 1letá, 5-6 dm vys., větvnatá, draslavě srstnatá,  
s podlouhlými, mělce chobotnatě zubatými až celokraj-  
nými l. a žlutokvětými úbory. Zákřov 2 řadý: vnitřní řada

\*) Pampeliška srstnatá = *Leontodon taraxacoides* MERAT.