

- hispanica.* 4. S. caule ramofo, fol. amplexicaulibus integris ferrulatis.
- gramini-folia.* 5. S. fol. lineari-ensiformibus integris carinatis.
- purpurea.* 6. S. fol. lineari-subulatis integris canaliculato-triquetris, pedunc. cylindricis. *Jacq. austr. t. 35. Antherae albae. Mygind.*
- angustifolia.* 7. S. fol. subulatis integris, pedunc. incrassato, caul. basi villosa.
- hirsuta.* 8. S. fol. linearibus cauleque unifloro hirsutis. *Mant. 278. Tragopogon calycibus corolla brevioribus, foliis integris strictis ciliatis, caule hirto, pedunculis superne incrassatis. Ger. prov. 257. Tragopogon hirsutum. Bauh. pin. 274. Tragopogon alter luteus. Column. ecphr. 1. p. 234. t. 233.*
- resedifolia.* 9. S. fol. obtuse dentatis, caule divaricato, calyc. apicibus tomentosis. *Bocc. sic. 13. t. 7. f. A.*
- laciniata.* 10. S. fol. linearibus dentatis acutis, caul. erecto, calyc. squamis patulo-mucronatis. — *Jacq. Fl. austr. v. 4. t. 356. M.*
- orientalis.* 11. S. fol. sinuatis denticulatis acutis, caul. subunifloris.
- taraxacifolio.* 12. S. fol. runcinatis petiolatis, scapo ramofo, aphyllis. *Jacq. in Litt. Misc. v. 3. Icon. rar. M.*
- tingitana.* 13. S. fol. omnibus runcinatis amplexicaulibus.
- Picroides.* 14. S. fol. superioribus amplexicaulibus integerrimis, inferioribus runcinatis, pedunc. squamosis. *Pappus pilosus.*

907. PICRIS. *Recept. nudum. Cal. calyculatus. Pappus plumosus. Sem. transversim sulcata.*

- Echioides.* 1. P. perianthiis exterioribus pentaphyllis interiore aristato majoribus.
- Hieracioides.* 2. P. perianth. laxis, fol. integris, pedunc. squamatis in calyceem. *Folia lanceolata. Pedunculi in calyceem usque adspersi squamis subulatis, donec calyx fere imbricatus fiat.*
- japonica.* 3. P. perianth. hispidis, fol. dentatis, pedunculis subaphyllis hispidis. *Thunb. jap. mspt. M.*
- asplenoides.* 4. P. fol. pinnatifidis: lobis alternis rotundatis. †