

ка высокотравного кленовника, 1600 м, 19 VII 1945, В. Письяюкова; басс. р. Варзоб, ущ. р. Кондоры, северный склон в среднем течении р. Кондоры, в нижнем поясе кленовников, 13 VII 1945, она же; долина р. Варзоб, берег р. Обиджал, 12 VII 1933, Б. Федченко и Е. Черняковская; долина р. Джиджикруд, северный склон хр. Сигды, 1700—2000 м, 21 VIII 1889, А. Регель; хр. Дарвазский около Сытарг, 17 VII 1916, Б. и Ан. Федченко, О. Кнорринг, Е. Черняковская; там же, ур. Полизак, 6 VII 1916, они же; долина правого притока Сандал-Дарьи, недавно освободившаяся от снега, 2 XI 1933, Ю. Григорьев, А. Королева и В. Никитин; северный Дарваз, долина Вахша, 2000 м, 29 VIII 1881, А. Регель; басс. р. Пяндж, возле сел. Поршнева, 2000 м, 7 VIII 1901, Алексеенко; Яккабаг-Бахча, 1540 м, 19 VI 1896, В. Липский; Бальджуан, р. Ях-Су, 1400 м, 4 VII 1897, он же; Шугнан, на площадке между устьями Остин и Бихчун, 1914, Н. Тутурин и П. Беседин; долина р. Гунт, Ривак-Хорог, 23 VII 1901, О. и Б. Федченко; там же, Ванкала-Ривак, 22 VII 1901, они же; там же, Ривак, 29 VII 1901, они же; там же, Хорог, 24 VII 1901, они же; там же, 1901, М. Тулинов; там же, луга вдоль р. Пяндж, окрестности Хорога, у рудника, 29 VII 1931, С. Липшиц. Китай: Восточный Тянь-Шань, р. Текес, у реки на камнях и на лугу, 7 VII 1893, В. Роборовский.

*Picris junnanensis* V. Vassil. sp. nova. — *P. hieracioides* auct. fl. chinensis, non L. — Annua vel biennis, caulibus rectis, 30—35 cm alt., in parte inferiore atripurpureis vel rubris, pilis rugulosis, atripurpureis, ad basin incrassatis, simplicibus vel glochidiatis cum 2 glochidibus, ramis praecipue in parte superiore, rosula e foliis radicalibus paucis, lineari-lanceolatis, petiolatis; foliis caulinis sessilibus, subamplexicaulibus, lanceolatis vel linearibus, dentibus paucis vel sinuato-dentatis, nervis mediis purpureis, subtus pilis simplicibus, rigidis, marginibus pilis simplicibus tectis, utrinque glabris vel (rarius) pilis paucis superficie superiore tectis. Calathidia numero 3—6 apice ramorum disposita, 2.5 cm lg. (cum corolla), 1.5 cm lg. (sine corolla), phyllis atrivirentibus, marginibus carinisque pilis longis, simplicibus tectis. Flores aurantiaci, tubo 1.5—2-plo laminae brevioris. Achenia rostello brevi, obsolete longitudinaliter sulcata, transverse valde undulato-rugulosa, 4—5 mm lg. Pappus biserialis flavidi-albus, setis seriei externae subsimplicibus, seriei internae plumosis. Fl. VI—initio VII, fr. — finis VII—VIII.

In pinetis.

T y p u s. China australis, regio Junnan, in pinetis in declivitate orientali jugi Lichiang, 3140 m s. m., VII 1906, n° 2421, Georg Forest. In Herb. Inst. bot. Ac. Sc. URSS (Leningrad) conservatur.

A f f i n i t a s. Species haec a proximo *P. hieracioides* L. caulibus pilisque atripurpureis, calathidiis majoribus, ligulis aurantiacis, foliis et phyllis involucri pilis simplicibus praeditis differt.

Растение однолетнее или двулетнее. Стебель прямой, 30—35 см выс., в нижней половине темнокрасный или красный, покрыт жесткими темнокрасными, к основанию утолщающимися, торчащими, простыми или с двумя якоревидными крючочками волосками, ветвящийся преимущественно вверху, с розеткой немногочисленных линейно-ланцетных черешчатых прикорневых листьев; стеблевые листья сидячие, полустеблеобъемлющие, ланцетные или линейные, с редкими острыми зубчиками или выемчато-зубчатые, с темнокрасной средней жилкой, снизу усаженной длинными жесткими простыми волосками, по краям с длинными окрашенными щетинистыми волосками, снизу и сверху голые или (реже) с немногими жесткими волосками на верхней поверхности. Корзинки в количестве 3—6 по одной на конце разветвлений стебля, с венчиком до 2.5 см дл., без него — до 1.5 см дл.; листочки обертки темнозеленые, по краю и килю с длинными жесткими простыми волосками; цветки оранжевые; трубка венчика в  $1\frac{1}{2}$ —2 раза короче отгиба, вверху с шелковистыми волосками, кверху растрескивающаяся; семянки с коротким, кверху несколько расширяющимся носиком, неясно продольно бороздчатые, резко поперечно волнисто морщинистые, 4—5 мм дл. Хохолок двухрядный, желтовато-белый; волоски наружного ряда почти простые, внутреннего — перистые. Цв. VI—начало VII; пл. — конец VII—VIII.

Светлохвойные леса.

Т и п. Китай, провинция Юньнань, изреженный сосновый лес на восточном склоне хр. Лихиянг, 3140 м над ур. м., VII 1906, № 2421, Георг. Форест. Хранится в Гербарии Бот. инст. АН СССР (Ленинград).

Р о д с т в о. Наиболее близок к *P. japonica* Thunb., от которого отличается окраской стебля и волосков, более крупными корзинками, оранжевыми венчиками цветков, листьями и листочками обертки только с простыми волосками.