

latis reflexis, anthodii pruinosi apice aequalibus. In cacumine montis Beschbarmak (alt. 110 hexap.)

468. *L. caucasicus* Stev. M. a B. Fl. T. C. 3 p. 530. In pratis subalpinis et alpinis totius Caucasi (alt. 900 — 1400 hexap.)

469. *L. glaucescens* M. a B. l. c. In arvis et campis prope Baku.

470. *L. alpinus* Stev. (non Hoppe) M. a B. l. c. p. 531. In pratis subalpinis et alpinis totius Caucasi (alt. 1000 — 1680 hexap.). Variat foliis integerrimis et runcinatis.

CLXII. PICRIS LINN. Spr. Syst. veg. 3 p. 366.

471. *P. hieracioides* Linn. Spr. l. c. p. 663. In pratis, campis etc. promontorii caucasici (alt. 210 — 500 hexap.); nec non in campis prope castellum Grosnaja et in regione subalpina Caucasi orientalis (alt. 800 hexap.)

472. *P. strigosa* M. a B. Spr. l. c. In campis et collibus prope Baku, in monte Beschbarmak et in montibus Talüsch prope pagum Drych (alt. 250 hexap.)

473. *P. laevis mihl.* P. subglabra, caule assurgente multifloro, foliis sublinearibus sinuato-dentatis, superioribus subintegerrimis, involuero adpresso anthodioque pubescenti - cano. Hypochoeris canescens Stev. M. a B. Fl. T. C. 3 p. 539. In promontorio Caucasi ad ripas fluviorum Podkumok, Malka, Terek, Sunscha. (alt. 150 — 370 hexap.)

CLXIII. HIERACIUM LINN. Cass. l. c. vol. 15 p. 37.

474. *H. Pilosella* Linn. Spr. Syst. veg. 3 p. 639. In campis prope Wladikawask (alt. 300 hexap.) et in herbidis altiorum montium Talüsch (alt. 900 hexap.)

475. *H. cymosum* Linn. Spr. l. c. p. 641. In promontorio Caucasi occidentalis (alt. 400 hexap.) et in campis nemoribusque montium Talüsch (alt. 900 hexap.)

476. *H. Gochnati* Spr.? Spr. l. c. p. 639. Cum antecedente.