

*Launea resedifolia* O. Ktze. — B.: Sidi Kalifa.

*Matricaria aurea* Boiss. — B.: Fra Selmani e Hauari Osman, Hauari, fra Auà Zard e Due Palme.

*Microlonchus Duriaci* Spach — M.: Fra il bosco Zorda e Sidi Bu Zeid, 18 marzo; piana a W. di Merg, 9 aprile; bosco Zorda, 5 aprile.

Era noto solo dell'Uadi Naga presso Derna (*Taubert*, 1887).

*Notobasis syriaca* Cass. — B.: Regima, Benina, Uadi Ingar, Gsur el Galita. — M.: Bosco Zorda limite mer.-or., piana a NW. di Merg. — C.: Ain el Balang, es-Sneibat, El Megeris, Zavia Tert, El Guetinat, Uadi el Kuf. — D.: Ain Bent, Fetejah.

*Pallenis spinosa* Cass. — B.: Suani Osman, Regima, Bu Mariam, Hauari, Rahba. — M.: Uadi Umm el Anain.

*P. spinosa* var. *asteroidea* Aschers. — B.: Gsur el Galita, Rahba, fra Selmani e Hauari Osman. — C.: Zavia El Beida.

*Phagnalon rupestre* DC. — B.: Tanzalec, fra Selmani e Hauari Osman.

*Ph. rupestre* var. *graecum* (Boiss.) — C.: Uadi el Kuf.

*Picris* (Helminthia) *Manginiana* Pamp., sp. n. — *P. aculeatae* proxima. Caulis cum ramis elongatis 27 cm. (et ultra?) altus, striatus, e basi divaricatim ramosus setis albis patentibus longioribus simplicibus, minoribus glochidiatis hispidus. Folia oblongo-spathulata sinuato-dentata, circ. 10 cm. longa, radicalia in petiolum attenuata, superiora minora amplexicaulia. Capitula pedunculo 2 1/2-5 cm. longo; involucris phyllis externis lanceolatis 6-7 mm. longis, interioribus 10-11 mm. longis, omnibus 1 mm. latis; ligulis flavis; acheniis 2 1/2 mm. longis, transverse rugosis, in rostrum tenue subaequilongum abrupte attenuatis, pappo 7 mm. longo.

B.: Regima, Bu Mariam e fra Regima e Benina, aprile. — M.: Gasr el Maharuga, 31 marzo.

*Reichardia tingitana* Roth — B.: Bu Mariam, Lete, Uadi Ingar.

*Rhagadiolus stellatus* Willd. var. *hebelaenus* DC. — B.: Benina, Rahba. — M.: El Gatres. — C.: Zavia Tert.