

lata acuta dentata, utrinque pilosa. Florum panicula subfastigiata. Pedunculi alterni aphylli hispidae cernui. Perianthium duplex erectum hispidum. Corollae luteae. Pappus plumosus, seminibus oblongis rugosis. Thunb. jap.

*3. **PICRIS aculeata.**

P. caule erecto strigoso-aculeato; foliis elliptico-lanceolatis dentatis, floribus corymbosis, calyce hispido, exteriore laxo. W.

P. calycibus laxis, pedunculis subaphyllis, foliis elliptico-lanceolatis cauleque strigoso-aculeatis. *Vahl. symb. 2. p. 89.* *

P. hispida, aspera; catile superne nudo, foliis obovato-oblongis inaequaliter dentatis, floribus corymbosis, pedunculis superne incrassatis pappo plumoso stipitato. *Desf. atl. 2. p. 221.* *

P. calycibus simplicibus perianthio maximo obvallatis, foliis profunde sinuatis. *Gron. orient. n. 243.*

Hieracium montanum longifolium sinuatum asperitudine Borraginis. *Raj. hist. 3. p. 139.*

Helminthotheca hispida, pedunculis florum tumentibus. *Vaill. act. 1721. p. 206.*

Stachliches Bitterkraut. W.

Habitat in collibus incultis Barbariae. 24

*4. **PICRIS pauciflora.** W.

P. caule erecto hirto, foliis lanceolatis sessilibus denticulatis, pedunculis elongatis incrassatis, calyce hirto, exteriore laxo. W.

Wenigblüthiges Bitterkräut. W.

Habitat in Gallia australi. ⊙ (v. f.) *Desfontaines.*

Caulis erectus digitalis et ultra hirtus. Folia radicalia uncialia lanceolata basi attenuata denticulata uti caulis pilis brevissimis erectis obsita, caulina sessilia semiuncialia. Pedunculi bini vel tres triunciales apice incrassati ut caulis hirti squamis lanceolato-subulatis 2 vel 3 instructi. Calyx hirtus calyculatus, squamis exterioribus subulatis patulis. Semina arcuata transversim rugosa. Pappus stipitatus plumosus. *Figura Hieracii pappoleuci Villars delph. t. 31.* huic similis. W.