

paucioribus et longioribus, antheris styloque longioribus, foliis magis virentibus, lobis eorum multò acutioribus.

Aliam in Pedemontio propè *Suza* legi plantam, huic magis quàm cæteris affinem sed paniculâ minùs expansâ, involucris breviter pedunculatis pallidis, akeniis breviùs oblongis umbilico latiore præditis et pappo duplò tantùm longioribus, foliorumque lobis minùs acutis diversam. — Olim in horto meo ex séménibus enata casu fortuito haud adulta periit.

PICRIS PINNATIFIDA Jord.

*P. pedunculis brevibus paulò incrassatis in apice ramorum subcorymbosis, involuci canescens pilis apice glochidiatis obsiti demùm suprà medium constricti foliolis lanceolato-linearibus obtusiusculis, exterioribus subpatulis, ligulis subtùs violaceis, akeniis fuscis transversè striato-rugulosis, foliis cinerascentibus utrinquè asperis hispidissimis, radicalibus angustè linearī oblongis undulatis crispis ad costam ferè medium pinnatifidis, lobis linearī-oblongis crispis sæpè recurvatis, caulinis pinnatifidis basi semi-amplexicaulibus, floralibus tantùm superioribus abbreviatis linearibus basi dentatis subintegrisve, caule striato hispidissimo aspero erecto ramosissimo, ramis elongatis arcuatopatentibus apice paucifloris, radice bienni.*

Hab. in siccis et incultis Occitaniae propè *Nismes*, *Uzès*, ubi eam ipse detexi. — Fl. jul. aug.

A *P. hispidissimā* Bartl. — *laciniatā* Vis. differt akeniis angustioribus magis tenuiter ruguloso-striatis, foliis cinerascentibus verè pinnatifidis nec tantùm laciniatis vel sinuato-dentatis, ramis elongatis patentibus nec strictè erectis, habitu proceriore diversissimo. — Utramque colui ex seminibus.