

Hab.—Burgos: Regumiel, Quintanar de la Sierra, prairies humides, vers 1100 m.

Leg. Hnos. Claudio et Elías.

N.º 4.442 **Picris Rieli** Senn.; st. **hieracicoides**.

Planta ramosissima, valde hispida; pedunculi fistulosi, claviformes; bractæ externæ periclinii reflexæ, internæ applicatæ, acutæ; styli fusci; achænia læte fusca rubescentia, transverse striolata.

Plante très rameuse, très hispide sur les tiges, les rameaux et les feuilles, celles-ci sessiles-oblongues acuminées-déjetées, largement laciniées-ondulées sur les bords; pédoncules fistuleux-claviformes-pauci-bractéolés-pubérulents, courtement hispidulés; bractées extérieures du péricline réfléchies; les intérieures appliquées-aiguës faiblement scarieuses aux bords, atteignant le sommet des aigrettes blanches légèrement subrubescentes; pointes extrêmes noires-rubescents dans les ligules; styles bruns; akènes d'un beau brun rubescent, finement et admirablement striulés-sinués en travers.

Hab.—Cerdagne, où il abonde par les marges herbeuses: Llivia, Saréja, Estavar, Angoustrine, Villeneuve, Llo, Osséja...

Note.—Dédicace d'affectueuse estime à M. le Dr. Philibert Riel, Président de la Société Linnéenne de Lyon.

N.º 4.997 **Leontodon Molineri** Senn. et El.

Scapus crassus; folia omnia radicalia, anguste lanceolata; periclinium fuscescens; bractæ anguste lanceolatae, applicatæ.

Souche épaisse d'un noir rubescent; hampes moncéphales-striées-sillonnées-glabres, légèrement pubérulentes à la base, bractéolées vers le sommet faiblement