

5. PICRIS *asplenioides*.

P. caule adscendente scabro, foliis oblongo-lanceolatis obtusis sinuato-pinnatifidis, pedunculis elongatis in-  
crassatis, calyce scabro, exteriori reflexo. W.

P. foliis pinnatifidis, lobis alternis rotundatis. *Sp. pl.*  
1115. *Vahl. symb.* 2. p. 90.\*

P. caule basi prostrato, foliis asperis, inferioribus run-  
cinatis, lobis rotundatis, calycibus rotundatis, folio-  
lis apice reflexis. *Desf. atl.* 2. p. 222.\*

Leontodon (*muricatum*) foliis runcinatis scabris, caly-  
cibus muricatis imbricatis laxis subreclinatis. *Herit.*  
*stirp.* 173. t. 82.\*

Virea (*scabra*) caule ramoso folioso, foliis oblongis ly-  
rato-sinuatis, caulinis sessilibus. *Scop. del. in sub.* 2.  
p. 25. t. 13.\*

Helminthotheca hispida asplenioides, succo sulphureo.  
*Vaill. act.* 1721. p. 206.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 9. p. 21.

Strichfarrenblättriges Bitterkraut. W.

*Habitat in arenosis maritimis Barbariae.* 4 (v. v.)

\*6. PICRIS *ruderalis*.

P. caule erecto hispido, foliis lanceolatis ciliato-denta-  
tis, pedunculis calycibusque hispidis. W.

Picris ruderalis. *Schmidt.*

Felsen-Bitterkraut. W.

*Habitat in Bohemiae rupibus circa Pragam.* 4 (v. f.)

Radix praemorsa. Folia radicalia uncialia angusto-  
lanceolata ciliato-dentata hispida; caulina sparsa sen-  
sim minor. Caules plures semipedales erecti hispidi.  
Pedunculi alterni, a basi ad apicem caulis, remoti, folio  
suffulti, valde hispidi. Flos parvus magnitudine Cre-  
pidis tectorum. Calyx calyculatus, foliolis hispidis  
exterioribus patulis. Semina elliptica striis numerosis-  
simis transversalibus notata. Pappus sessilis plumo-  
sus. W.