

niis acutis angustissimis dentatis, scapo-anthodioque glabriuscule. An *A. macrorrhiza* Güntheri, ex Spreng. System. vegetab. 3. pag. 665? sed in nostra pili trifurcati non simplices.

— — *B. Elata*; foliis runcinato-pinnatifidis, lacinias remotis dentatis.

In pascuis montium Aprutii: *A. Velino*, *B. Majella*, *Monte Corno*.

* 5. *A. cichoracea*; scapo squamoso 1-floro glabro, foliis obovatis dentato-runcinatis glabriusculis, petiolis hirtis pilis furcatis simplicibusque, calycinis squamis acutis hirtis, radice tubero-fasciculata. *Ten. Fl. nap. prodr. p. 46.* (1811) et *Fl. nap. II. pag. 166. tav. 71. A. fasciculata*. *Biv. Stirp. rar. manip. 2. tab. 2.* (1814) et *Spr. Syst. veg. 3. pag. 664.*

In pascuis montosis: *M. S. Angiolo di Castellammare al Piano di Faito*, *Pollino*, *Ruggia*, *Martina*, *Ginosa*; *Monti di Abruzzo*. Perennis.

6. *A. incana* Scop. *Gargano*.

7. *A. alpina*.

In editioribus montibus Aprutii: *M. Corno*, *Majella*.

8. *A. aurantiaca* Kit. non *A. aurea* Willd.

In glareosis alpinis Aprutii: *Costone* (Guss.); *M. Corno*, *M. Amaro*, *Majella*, *Focaleto*, *Velino*.

Obs. Scapus depresso flexuoso, folia angustissima.

9. *A. Rosani*; scapo nudo unifloro glabriuscule prope florem hispido, foliis runcinato-pinnatifidis hispidis lobis remotissimis, terminali triangulari-hastato pilis glochidiatis, calycibus hispidis, radice fibrosa. *Ten. Ind. Sem. H. R. Neap. pro 1825* (in notis) pag. 11. Ad *Fl. neap. prodr. app. V. p. 26.*

In collibus circa Potentiam (Rosano); in insula Iarimes: discesa de lo jetto, alle salde dall' Epomeo, (Guss.).

Obs. Ab *A. Villarsii* differt in primis pilis glochidiatis non simplicibus.

10. *A. Villarsii*.

— — *B. Foliis glabriusculis*.

In Aprutii montibus: *Monte de fiori*.

* 11. *A. Taraxaci*.

In glareosis Aprutii: *M. Corno*, *Majella*.

12. *A. hastilis*.

— — *B. foliis spathulato-oblongis obiter dentatis*.

In pascuis alpinis Aprutii: *Chiarino*, *Bilancino*. *B. Majella*.

1. *Thrinacia* hirta.

Majella.

2. *T. nudicalyx* Lagas.

— — *B. Glabra*.

In collibus argillosis Aprutii: *Giulia nova*, (Orsini). *B. Majella*.

Obs. In ultraque calyces glaberrimi non hirti, ut in *T. hirta*, cum qua immixtio a cl. Spr. associatur; in *B. folia subintegerrima* glabriuscula.

* 3. *T. tuberosa* Cand. *Apargia tuberosa* W.

— — *B. foliis runcinato-pinnatifidia*. *Apargia lyra*. *Ten. Fl. nap. Prodr. pag. 46.*

In pratis arenosis et montanis: *Pozzuoli*, *Baja*, *Principati*, *Gargano*, *Bari*, *Ginosa*, *Lecce*, *Calabria*; *B. Monopoli*.

Obs. In *B. foliorum* facies omnino diversa, lacinias oblongae utrinque remote dentatis.

* 1. *Hyoseris radiata*.

In campis Apuliae.

* 1. *H. Incida*.

Ad agrorum margines et in collibus Putolorum.

* 5. *H. scabra*.

Bari, *Lecce*, *Basilicata*, *Principati*, *Caseria*, *Capua*.

* 1. *Hedypnois tubaeformis*; caulinis diffusis, incurvis ramosis, foliis obovato-spathulatis subdentatis hispidis, pilis simplicibus, calycibus hispidis, pedunculis clavatis fistulosis maximis. *Ten. Fl. nap. II. pag. 179. tav. 73.*

In collibus apricis insulæ Caprearum, Lucaniae, Apuliae: *Tuberculare*.

Obs. Caulis omnino humifusus, folia cuneiformi-oblonga obiter dentata, anthodia hispida.

* 2. *H. rhagadioides*.

In collibus apricis: *Capri*, *Campobasso*.

Obs. Caules erecti, folia profunda dentata, anthodiaque hirta.

* 5. *H. monspeliensis*.

In arenosis maritimis: *Miceno*: *Fusaro*.

Obs. Caules ascendentes ramosissimi, folia elliptica integerrima glabriuscula, anthodia glabra.

4. *H. coronopifolia*; caulinis diffusis glabris, foliis oblongo-spathulatis obtusis profunde dentatis pube tripartita hispidis, anthodia hispidiusculo, pedunculis incrassatis. *Ten. Fl. nap. prodr. pag. 46. Synops. ed. alt. pag. 60. Spr. Syst. veg. 3. P. 670.*

— — *A. Scapis declinatis aphyllis*.

— — *B. caulinis ramosis ascendibus*.

— — *C. foliis subpinnatifidis*.

In collibus sicciæ: *Principati*, *Basilicata*, *Lecce*; *B. et C.* in arenosis maritimis: *Bagnuoli*, *Pozzuoli*.

* 1. *Pieris hieracoides*.

In arvis et pascuis communis.

2. *P. scaberrima*; caule angulato eretto, foliisque pinnatifidia lacinias linearibus diversicatis remote dentatis hispidis, floribus subcesilibus lateralibus, anthodiis albo-tomentosis, foliolis latiusculis, pappo subcesili plumoso; planta undique pilis glochidiatis densis tecta. *Guss. pl. ex. ex. Calabria.* (inedita.)

Caulis 1-3-pedalis, folia radicalia , caulinis inferiora sessilia runcinato-pinnatifida, superiora sinuato-dentata, omnia undulato-crispa; flores in summitate caulinis alterni subcesiles, inferiores plerumque abortientes, superiores magnitudine *P. hieracoides*; anthodiis squamæ lanuginoso-incanæ; semina badia transverse striata.

In Calabria legit primum cl. Thomas: *Spazzano Albanese*; superrime autem in iisdem locis et *Tarsiae* cl. *Gussonius* invenit, et specimina mecum benevolè communicavit. Pereu.

3. *P. aculeata*.

In collibus maritimis Calabriæ: *Trebisacce*, *Amendolara*, *Carriati*, *Japygiae* (Guss.).

5. *P. grandiflora*; caule eretto striato paucifloro, foliisque lanceolato-linearibus deuticulato-ciliatis vel integerrimis acuminatis scabris, calyce nigricante hispido, exteriore patente, pedunculis squamosis, radii flosculis profunde 5-fidis, pappo subcesili pluoso *Ten. P. pauciflora?* Guss. plant. exsicco ex Aprutio.

Caulis 1 1/2-2 pedalis; folia radicalia 3-poll. long. 5-6 lin. lat. caulinis 3-poll. lon. 4-6 lin. lat; flores corymbosi terminales duplo majoræ quam in *P. hieracoides* (12-15 lin. diam.), pedunculi squamosi, anthodiis squamæ nigris, interiores (5-6 lin. long.), exteriore sensim breviores, plerumque adpres-