

Cauli e squame dell' involglio inermi. *Isola d' Ischia.*

β *mollis Duby.*

Squame involucri esterne molto più grandi delle interne, e pappo quasi sessile. *Melfi nel Napoletano.*

γ *mucronata Terracc.*

GEN. XXII. UROSPERMUM Scop.

(Da *oyra* coda e *sperma* seme, per gli achenj caudati).

Involucro campanulato di circa otto brattee in una sola serie, adese fra di loro alla base in una specie di coppa. — Alveoli del ricettacolo rialzati a guisa di papille tronche, perforate nel mezzo per dar passaggio al peduncoletto florale, peloso-fibrilliferi. — Achenj non striati muricato-aculeati, compressi, con un becco lunghissimo rigonfio e cavo alla base. Il pappo di più serie di setole piumose, riunite con un anello alla base, caduco.

Invoglio tomentoso, rostro dell'achenio gradatamente assottigliato dalla base all'apice: pianta pubescente γ . *Luoghi erbosi dalla Liguria e dal littorale Friulano giù per l'Italia media ed inferiore e nelle isole. Magg. Giug.*

U. DALECHAMPII Desf.

Invoglio ispido-spinuloso, rostro dell'achenio rigonfio alla base, pianta irsuta \odot . *Dalla Liguria e dal Friuli, giù nell'Italia meridionale, e nelle isole. Marzo, Maggio.*

U. PICROIDES Desf.

GEN. XXIII. PICRIS L.

(Da *picros* amaro).

Capolini multiflori. — Involucro di due serie di brattee embriciate, le esterne più brevi e patenti. — Ricettacolo areolato, nudo. — Achenj fusiformi, assottigliati all'apice e talora prolungati in un corto becco; hanno delle costole poco rilevate per il lungo, e sono scabri per molte sottili creste trasversali. Il pappo caduco consta di una serie esterna di setole semplici, brevi, rigide, irregolari; e di una interna di setole più lunghe, uniformi, piumose, un po' dilatate alla base.

A. Pianta annua, invoglio ventricoso, peduncoli uniflori.

B. Peduncoli ingrossati all'apice, eretti. *Nel Nizzardo e nella Liguria occidentale. Giug. Lugl.*
(*Crepis Sprengeriana Sprgl. in hb. Balb. Allion, aliorumq. non Lam.*)

P. PAUCIFLORA W.

BB. Peduncoli cilindrici divaricati. *Nel Nizzardo e nella Liguria occid. Giug. Lugl.*

(*Hieracium Sprengerianum L.*) P. SPRENGERIANA Lam.

AA. Pianta bienne o perenne, invoglio d'ordinario cilindrico, almeno nel fiore, peduncoli spesso bi-triflori.

C. Foglie inferiori intere e dentate.

D. Squame esterne dell' involglio patenti, foglie cauline ristrette alla base semiamplessicauli \odot . *Volgare nella penisola. Estate.* (P. *grandiflora Ten.*). P. HIERACIODES L. (*).

(*) Specie? Varietà?

P. SPINULOSA Bert. ap. Gusson. Fl. Sic. syn. (sphalmate etiam *strigulosa* nuncupata ab ipso Gussonio). = P. *stricta Jord.* (nome poster.), P. *hieracioides Ten. non alior. Napoli, Salerno, Sicilia.*

P. SETULOSA Gusson. ined. in hb. Pianta *stricta rudis*, foliis callosis-strigosis, maxime in margine: ramis floriferis abbreviatis; cephalis parvis dense congestis. Achenia (immatura) *cinnamomea* ad basim attenuata, transversim rugosa. *Palermo.*