

vel anguste lanceolatis, disperse, breve et simpliciter pilosis, interdum glabris, solum ad nervos medios et ad margines brevissime rigido pilosis, margine undulatis, dentibus paucis durioribusve instructis. Involucrum  $\pm$  nigrum, pilis longis, albis rariter et  $\pm$  dense productis. Pedunculus infra anthodium paucis incrassatus, glaber vel  $\pm$  dense albo pilosus.

*Reg. Mureş-Aut. M.:* ad saxa calcarea et herbosa montium Hăghimaşu Mare, alt. 1600—1750 m.

## PICRIS L.

**P. hieracioides** L. f. *gracilis* Nyár. f. nova.

Planta alta, caule tenuiore. Anthela paucis anthodiis instructa, irregulariter paniculato-ramificata, parce pilosa. Foliis parvioribus et distantioribus, 1,5—2,5 cm latis.

*Reg. Cluj:* Chiochiş (r. Gherla). *Reg. Mureş-Aut. M.:* Pietrele Roşii prope Tulgheş, Cheile Bicazului, ad radices montium Surduc, alt. 950 m (r. Gheorgheni). *Reg. Braşov:* Vâlcele (r. Sf. Gheorghe); Braşov, Mt. Piatra Mare. *Reg. Hunedoara:* Rîul Mare prope Gura Zlata (FRE nr. 2800 sub f. *foliosa* p.p.).

f. *albsetosa* Nyár. f. nova.

Pilis  $\pm$  albis.

*Reg. Cluj:* Canciu (r. Dej). *Reg. Braşov:* Vâlcele (r. Sf. Gheorghe), Mt. Piatra Craiului ad « Crăpătura » alt. 900 m.

f. *seriata* Nyár. f. nova.

Formae foliosae similis, sed pedunculis nudis vel paucis pilis glochidiatis producta, ad mediam foliorum involucralium solum pilis adpressis instructa.

*Reg. Cluj;* Cluj in V. Morii. *Reg. Suceava:* Solca prope Slatina, alt. 630 m (r. Gura Humorului).

f. *longifoliata* Nyár. f. nova. —  *Ic.:* Pl. 10, fig. 1, 1a.

Foliis inferioribus 1—3, 28—35 cm longis et usque 5 cm latis, in petiolo alato longe attenuatis, ceteribus sensim in inflorescentiam umbelliformam et  $\pm$  parvam attenuatis. Involucrum dilute viride, pilis  $\pm$  albis obtectum.

*Reg. Hunedoara:* prope refugium Pietrele montium Retezat (Herb. Nyár.). *Reg. Banat:* Băile Herculane (Herb. Nyár.).

f. *magnumbellata* Nyár. f. nova.

Anthela umbellata, pedunculis longis.

*Reg. Braşov:* Vâlcele (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Banat:* Mehadia (r. Orşova). *Reg. Bacău:* Mt. Ceahlău ad Izvorul Alb.

**P. sonchoides** Vest var. *leteae* Nyár. var. nova.

Caulis erectus, rectus, radicibus longis, verticalibus, ad apicem umbella longe radiata instructus. Involucrum 10 mm longum.

*Reg. Dobrogea:* solo arenoso ad marginem silvae, prope pagum Letea (Herb. Cluj).

var. **arenaria** Nyár. var. nova.

Caulis tenuis, elongato et profunde ramificatus. Involucrum 9 mm longum; achaena 4—4,5 mm longa.

*Reg. Dobrogea:* ad balneas Mamaia prope Constanța, in locis arenosis (Herb. Nyár.).

### TRAGOPOGON L.

**T. orientalis** L. var. **parallelus** Nyár. var. nova. — **Ic.:** Pl. 13, fig. 2.

Foliis linearibus, 1—3 mm latis, solum ad basin amplexicaulibus et latioribus.

*Reg. Cluj:* in cacumine Fruntea Pietrii montium Rodna prope Romuli, alt. 700—900 m (r. Năsăud).

### TARAXACUM Wigg.

**T. levigatum** (Willd.) DC. f. **rotundilobatum** Nyár. f. nova. — **Ic.:** Pl. 22, fig. 1a.

Foliorum lobi rotundati. — Hinc-inde, raro.

f. **angustilobatum** Nyár. f. nova. — **Ic.:** Pl. 22, fig. 1.

Planta validior, usque ad rhachidem sectata, lobis lanceolatis vel linearo-triangularibus. Foliis dense dentatis vel una cum rhachide fimbriatis.

*Reg. Cluj:* Cheia Turzii ad « Colțul Sîndului » et supra locum « Tisa » dictum (r. Turda); Cluj ad marginem silvae Mănăstur.

### SONCHUS L.

**S. arvensis** L. var. **comosus** Nyár. comb. nova.

Involucrum solum glandulosum, alabastro statu comosum. Pedunculis glabris.

*Reg. Cluj:* Cluj ad Someșeni. *Reg. Mureș-Aut. M.:* Sovata ad Cîmpul Ploștei (r. Tg. Mureș).

**S. × clujensis** Nyár. nomen = *asper* × *oleraceus* Bitter in Hegi Fl. Mitt.-Eur. VI. 2 (1929) 1110.

Planta robusta, praecipue statu juvenile habitu *S. asperi*, pungens; planta adulta foliis superioribus profunde sectatis, laciniis longis, linearo-lanceolatis, acutis. Segmenta terminalia anguste et elongato acuminata, non pungentia. *S. asperi* similis per folia laete-viridia, nitida, ± rigida, inferiora spinulosiora. Ad *S. oleraceum* per folia cordato amplexicaulia, auriculas elongatas et acuminatas, folia superiora praecipue mutica et per achaenas ubique transverse verrucosas admonet.