

Leontodon autumnale. *Lin. sp. pl. 1123* — *Ucria H. Pan. p. 333*.
 Prope Panormum, alla fossa de la Galofara (*Ucria*).

THRINCIA.

Roth catal. bot. 2. p. 97 — *Willd. sp. pl. 3. p. 1354. n. 1409* —
Endl. gen. n. 2989.

Anthod. multiflorum, polyphyllum; foliolis pluriseriatim imbricatis.
Sem. fusiformia, striata; in disco recta, ac adstrias muricato-sca-
 bra. *Papp. difformis*; seminum marginalium brevis coronaeformis
 dentatus, centralium plumosus ac stipitatus. *Recept. nudum*, foveo-
 latum. (*Herba perennis*; *folia omnia radicalia*, indivisa, vel runci-
 nata: *scapi 1-flori*: *flores nobiles nutantes, lutei*).

1. *T. TUBEROSA. Dec. fl. fr. 4. p. 52*, et *pr. 7. p. 100*.

T. radice tuberoso-fasciculata, foliis obovato-runcinatis indivisisque
 hispidiusculis pilis furcatis, scapis glabriusculis ebracteatis, antho-
 dio hirtio.

Apargia tuberosa. Willd. sp. pl. 3. p. 1349 — *Leontodon tuberosum*.
Lin. sp. pl. 1123 — *Ucria H. Pan. p. 333* — *Cichorium constanti-*
nopolitanum. Cast. H. Mess. p. 36.

1c. *Dens Leonis*, *Asphodeli bulbulis*, angustiori atrovirenti folio.
Bon. t. 93 — *Hieracium dens Leonis dictum*, angustifolium, per-
 crassiss. *Asphodeli bulbis pyriformibus. Cup. panph. 1. t. 140* — *Bon.*
t. 129, varietas bulbis radicalibus brevibus crassis — *Chondrilla*
 altera *Dioscoridis monspeliensium. Lob. ic. 252*.

In collibus apricis herbosis, in campis aridis, et in pascuis ubique
 in Sicilia = et in *Lipari*, *Maretimo*, *Favignana*.

Aprili, ad Octobrem. 2|

Radicis tubera fusca, ut in *Apargia cichoracea*; sed oblonga, inferne
 longe attenuata: *folia* aliquando hispido-canescencia, vel glabrata,
 apice acuta: *scapi* ascendentes: *anthodii* foliola exteriora pauca
 breviora; interiora carinata: *semina* disci fusca, in stipitem attenua-
 ta, ad apicem scabriora; radii incurva, albida, fere levia, anthodii
 foliolis inclusa, et cum illis persistentia.

PICRIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1231 — *Endl. gen. n. 2992*.

Anthod. multiflorum, polyphyllum; foliolis imbricatis, exterioribus
 brevioribus patentibus. *Sem. transverse rugosa. Papp. conformis*,
 plumosus, sessilis, deciduus. *Recept. nudum*, alveolatum. (*Herbae*
biennes, aut perennes, plus minus pilis furcatis hirsutae: *folia* in-
 divisa, vel sinuato-dentata: *flores lutei, subcorymbosi*).

1. *P. SPINULOSA. Bertol. ined.*

P. pilis furcatis patentibus setisque hirta, caule erecto angulato-sul-
 cato ramoso, foliis oblongo-lanceolatis dentato-sinuatis, superiori-
 bus amplexicaulibus integris, floribus subcorymbosis, pedunculis
 non incrassatis, anthodii villosi foliolis ad carinam incrassato-spi-
 nulosis, exterioribus semipatentibus apice subsquarrosis, pappo sessili.

P. hieracioides. *Ten. fl. nap.* 2. p. 1801, et *Ucria H. Pan.* p. 329, non *Lin.* — *Hieracium asperum*, unicaule, altissimum, angustifolium, polycephalum. *Cup. H. Cath.* p. 95 — *H. pratense*, luteum, hirsutum. *Cast. H. Mess.* p. 36.

lc. *Hieracium altissimum*, polycephalum. *Cup. panph.* 2. t. 110 — *H. altissimum*, longifolium, sinuatum, asperum, unicaule, polycephalum. *Bon. t. 151*, optima.

In sylvaticis, in dumetis, ad sepes ubique in Sicilia = et in *Felicuri sul monte*, *Lipari a S. Angelo*.

Junio, Septembri. ♂, et ♀

Caules solitarii, in umbrosis fere orgyales, superne alterne ramosi; ramis erectis: *folia* tuberculato-hispida; radicalia ac caulina inferiora in petiolum attenuata, 3-5 poll. longa, 4-12 lin. lata: *flores* flavi, aliquando alterni in foliorum inferiorum axillis, vel in extremitate ramorum saepe glomerato-fastigiati: *pedunculi* fistulosi, squamis paucis brevibus angustis instructi: *anthodii* cylindraceo-ovati foliola lanceolata, acuminata: *semina* nigra, parum incurva, glabra, oblonga, apice truncata: *pappus* candidus.

Differt a *P. hieracioides* hirsutiae majore, *anthodii* foliolis caractere; floribus paullo minoribus: potius *P. laciniatae Vis. pl. rar. Dalm.* p. 24 magis proxima, quoad specimen a Cl. auctore communicatum, at pedunculis non incrassatis aliisque notis aliena; uti etiam planta dalmatica a *P. scaberrima* mea eodem pedunculorum caractere, et *anthodii* minime albo-farinosis quoque distincta videtur.

HELMINTHIA.

Juss. gen. p. 170 — *Willd. sp. pl.* 3. p. 1607 —
Endl. gen. n. 3000.

Anthod. multiflorum, polyphyllum; foliolis duplici serie; exterioribus quinque, latioribus, patentibus; interioribus sublongioribus, erecto-conniventibus. *Sem.* compressiuscula, oblongo-elliptica, transverse rugosa. *Papp.* uniformis, plumosus, stipitatus. *Recept.* nudum, punctatum. (*Herbae* perennes, biennesve: *folia* integra, vel sinuato-pinnatifida: *flores* erecti, lutei, corymbosi).

1. *H. ECHIOIDES*. *Willd. l. c.*

II. caule erecto ramoso hirsutiusculo, foliis strigoso-hispidis, radicalibus caulisque inferioribus oblongo-obovatis integris vel sinuato-pinnatifidis, superioribus oblongo-lanceolatis integris amplexicaulibus, floribus subcorymbosis, *anthodii* exterioribus foliolis cordato-ovatis margine ciliato-spinosis interiora subaequantibus, seminibus glabris.

Pieris echioides. *Lin. sp. pl.* 1114 — *Ucria H. Pan.* p. 329 — *Hieracium echioides*, capitulis *Cardui benedicti*. *Cup. H. Cath.* p. 94.

lc. *Lam. ill. gen. t.* 648 — *Buglossum echioides*, luteum, *Hieracium cognatum*. *Lob. ic.* 377.

In campis humentibus, ad fossas ubique in Sicilia = et in *Ustica*.

Aprili, Augusto. ♀

Caules saepe autumnum decumbentes, et aliquando glabrati: *folia* ac *anthodia* spinulis et pilis furcatis strigoso-aculeata: *pedunculi* 1-flori, ebracteati, vix incrassati: *anthodii* interioris foliola lineari-lanceolata, sub apice arista pinnata terminata; in fructu ad carinam