

ginatis argutè denticulatis, stipulis erectis lineari-lanceolatis acuminatis in lobos lineares dissectis, caulibus pubescenti-villosis prostratis elongatis.

Hab. inter segetes et in herbosis maritimis propè *Marseille! Hyères!* — Flor. maio. ☉. — Pedunculi sæpiùs 1 rariùs 2-3 flori: bracteolæ lanceolatae acuminatae pedicellos subæquantes: loborum calicis sinibus acutis: vexillum patens extùs luteo-rubescens intùs sicut alæ et carina flavidum: legumina illis *M. Gerardi* paulò majora.

A *M. Timeroyi* differt pedunculis brevioribus demùm pendulis, dentibus calicis latioribus, leguminibus haud ovatis brevioribus latioribusque valdè appianatis demùm glabris, cyclis paucioribus approximatis ad marginem carinatis, spinis latioribus magis apice uncinatis, caulibus prostratis.

A *M. Gerardi* W. et K. differt leguminum formâ et glabritie, cyclis ad suturam minùs obtusis haud concretis, spinis elongatis minùs basi conico-inflatis.

(31) **MEDICAGO TIMEROYI.** Jord. Pedunculis 1-6 floris folio longioribus fructiferis erecto-patulis, dentibus calicis angustè lanceolato-linearibus acutis nervo tenui carinatis tubo obconico pilis erecto-patulis tecto longioribus, vexillo calice vix duplò longiore elliptico-ovato leviter emarginato, alis ovatis submarginatis vexillo duplò brevioribus carinam obtusam subæquantibus, leguminibus brevissimè glanduloso-puberulis ovato-globosis utrinque planis, cyclis 5-6 lineâ arcuè accumbentibus laxiusculis, suturâ exteriorè obtusâ ferè ecarinata utrinque spinigerâ, spinis erectis parùm obliquis conico-linearibus apice recurvis suturæ diametro transversali sub duplò longioribus, foliolis lætè virentibus laxè pubescentibus obovato-cuneatis subtruncatis argutè denticulatis, stipulis obliquè erectis lineari-lanceolatis acuminatis basi in lobos lineares dissectis, caulibus ascendentibus pubescentibus.

Hab. inter segetes et in herbosis apricis; *Villeurbanne* propè *Lyon* (Timeroy), *Prades!* (*Pyr.-Orient.*) — Fl. maio. ☉. — Pedunculi sæpiùs 3-4 rariùs 5-6 vel 1-2 flori: pedicelli calicis tubo breviores: bracteolæ ovatae cuspidatae pedicello duplò breviores: loborum calicis sinibus rotundatis ipsis latioribus: vexillum intùs sicut alæ et carina pulchrè flavum extùs pallidum: ovarium oblongum dorso densè hispidulum: stylus incurvus filiformis ovario vix longior: semina 9 reniformia.

A simillimâ *M. Gerardi* W. et Kit. evidenter differt: floribus numerosioribus minùs pallidè flavis, pedunculis fructiferis haud declinatis, calice haud patenter villosa, dentibus angustioribus, vexillo minùs acutè emarginato, alis latioribus, leguminibus majoribus pilis multò brevioribus tectis utrinque magis planis, spinis minùs crassis haud adpressis ad suturam ferè ecarinatis, spinis longioribus basi minùs incrassatis apice tantùm recurvis sed non uncinatis, stipulis multò tenuiùs dissectis magis cauli approximatis, foliis minùs cinereis, pubescentiâ parciore, caulibus majoribus ascendentibus nec omninò prostratis.

(32) **PICRIS STRICTA.** Jord. Racemo elongato angusto, ramis strictè erectis, pedunculis erectis subumbellatis involucrique caescentibus hirtisque pilis patentibus apice glochidiatis, involucri fructiferi ventricoso-ovati versùs medium strangulati foliolis linearibus acutis, exterioribus infernè adpressis suprâ medium patentissimis, akeniis fuscis transversim striatis rugulosis, receptaculo nudo, foliis pallidè virentibus utrinque hispidulis asperis, radicalibus elongatis profundè sinuatis subundulatis basi attenuatis acutis, caulibus lanceolatis supernè attenuatis basi cordatâ sessilibus integris vel subdentatis, caule striato hispidissimo aspero simplici vel ramoso, ramis erectis sæpè axi adpressis.

Hab. in incultis, ad vias propè *Sisteron! Laragne!* et probabiliter in aliis Galloprovinciæ vel Occitaniæ locis. — Fl. august. ♂. — Flosculi exteriores subtùs sæpè violacei vel ferè concolores: caulis 6-8 dec. altus, ut tota planta hispidissimus.

A simillimâ *P. hieracioide* L. differt racemo terminali angustiore elongato ramis multò minùs patentibus strictioribus, involucri foliolis exterioribus magis patentibus, akeniis minoribus minùs conspicuè muriculatis, foliis flavescenti-viridibus magis supernè attenuatis.

(33) **PICRIS VILLARSI.** Jord. *P. pyrenaica* Vill., III, p. 148, non L. Racemo terminali laxè corymboso, ramis paucifloris patulo-erectis sæpè ascendentibus subflexuosis, pedunculis longis haud apice incrassatis involucrique tomento caescente parcissimè