

Communis ad vias et agrorum verfuras. Floret Junio, Julio, Augufto. 2

1603. PICRIS *frigofa*.

P. caule bafi ramofa patulo frigofa, foliis lanceolatis dentatis, floribus fparfis, calyce exteriori laxo.

P. calycibus imbricatis: varietas flore minore et pallidiore, hispidiffima. *Gmel. fib. 2. p. 39 sub n. 32.*

Habitat in collibus herbidis promontorii Caucafici orientalis, verfus mare caspium, circa faxum Befchbarnak. Floret Junio, Julio. 2

*Planta pedalis ramofiffima dinaricata frigofiffima: pilis albidis furcatis. Pedunculi per caulem et ramos fparfi minime corymbofi. Flores praecedente duplo minores: corollulis pallidis. Semina et pappus praecedentis. Affinis quoad habitum P. asperae Spreng. fed distincta frigofitate majore, floribus minoribus et praefertim feminibus minoribus rugis tuberculisque minus exasperatis, fufcefcentibus nec nigricantibus.*

400. HELMINTIA. Recept. nudum. Cal. duplex: exterior 5-phyllus, longitudine interioris. Semina tranfuerfim ftriata. Pappus ftipitatus.

1604. HELMINTIA *echioides*.

*Helmintia. Linn. ed. Willd. 3. p. 1607.*

*Picris (echioides) perianthiis exterioribus pentaphyllis, interiore aristato majoribus. Linn. spec. pl. p. 1114. Curt. lond.*

*Hieracium echioides. Tabern. Kraeut. p. 496.*

*Hieracium capitulis Cardui benedicti maximum, Bugloffum echioides quibusdam. J. Bauh. hift. 2. p. 1028.*

In aruis et ruderatis Tauriae, Caucafi orientalis et Iberiae obuia. ☉