

Centaurea solstitialis L. — Boiss. III. 685. — Keredj, steinige Plätze (14. VII. 1933).

Centaurea iberica Trev. — Boiss. III. 696. — Keredj, auf Feldern (14. VII. 1933).

Zoegea Leptaurea L. — Boiss. III. 697. — Elburs, Kandawan, an Wegen (VIII. 1934).

Zoegea purpurea Fresen. — Boiss. III. 698. — Keredj, Elburs-Hänge (16. VI. 1934); Steppenhügel bei Paschand, 1700 m (9. VII. 1936; no. 966).

Crupina crupinastrum (Moris) Vis. — Boiss. III. 699. — Keredj, Hänge des Elburs (10. VI. 1933).

Callicephalus nitens (M. B.) C. A. M. — Boiss. III. 703. — Elburs, Nordhänge des Kandawan-Passes, 2400 m (3. IX. 1935; no. 656).

Cnicus benedictus L. γ. **Kotschy** (Sz. Bip.) Boiss. — Boiss. III. 705. — Keredj, steinige Plätze (10. VI. 1933).

Carthamus glaucus L. — Boiss. III. 707. — Keredj, wüste Plätze (29. VI. 1934).

Carthamus oxyacantha M. B. — Boiss. III. 709. — Keredj, wüste Plätze (14. VII. 1933).

Compositae-Liguliflorae.

Cichorium Intybus L. — Boiss. III. 715. — Keredj, Wegränder (15. VII. 1934).

Lapsana communis L. — Boiss. III. 720. — Keredj, Wegränder (14. IX. 1933).

Koelpinia linearis Pall. — Boiss. III. 721. — Keredj, Steppe (20. V. 1933).

Garrhadiolus Hedypnois F. et M. — Boiss. IV. 723. — Elburs, bei Paschand, steinige Hügel (16. V. 1933) und Hänge bei Kalak (11. VI. 1934; no. 619).

Leontodon hastilis L. α. **hispidus** (L.). — Boiss. III. 730. — Elburs, Assem Warak am Kandawan (25. VIII. 1934; no. 660); südliche Hänge am Kandavan, 2800 m (28. VII. 1936; no. 970).

β. **glabratus** Koch. — Boiss. III. 730. — Elburs, Keredj-tal bei Germab, 2100 m (8. XI. 1935; no. 661).

Leontodon Kotschy Boiss. — Boiss. III. 720 („*L. asperum* W. K. β. *Huetii* Boiss.“, quoad pl. Persiae). — Elburs, Hessarband, 2400 m (14. VII. 1935; no. 659). — Vgl. Bornm., Beitr. Elburs, S. 179.

Leontodon asperimus (Willd.) Boiss. — Boiss. III. 792. — Elburs, bei Allangeh (12. VII. 1934).

Picris strigosa M. B. — Boiss. III. 736. — Elburs, bei Gatschesar in einem Seitental („Sirah“) des Keredj, 2400 m (31. VIII. 1935; no. 655 a). — Eine eigenartig zarte Form (*f. gracilis*) stellt eine im Sefidrud-Tale bei Rudbar gesammelte Pflanze dar (29. V. 1935; no. 793) mit kleinen auffallend schmalen Köpfchen, deren Hüll-

schuppen mit schwärzlichen Haaren ziemlich dicht besetzt sind; ganze Pflanze nur 20–30 cm hoch, Stengel und Zweige schwächlich, Köpfchenstiele dünn. Ob standörtliche Verhältnisse den Wuchs beeinflußt haben oder ob eine eigene Unterlage vorliegt, kann nur weitere Nachforschung an Ort und Stelle entscheiden. — Bemerkenswerter ist eine weitere Form:

β. subinflata Bornm. et Gauba (var. nov.), divergens a typo capitulis eximie majoribus, phyllis 12–13 mm longis sparsimque tantum setis strigosis (vel subnullis) obsitis; pedunculis evidenter (praesertim infra capitulum) inflatis ideoque 2,5 mm diametricis; tota planta in partibus superioribus paulisper tantum strigosa (inferne ut in typo ad folia dense strigosa). — Elburs, bei Gatschesar bei 2700 m (28. VIII. 1934; no. 655 b) und ebenda an den Hängen des Hessarband, 2500 m (14. VII. 1935; no. 655 a). — B.

Picris pauciflora Willd. — Boiss. III. 737. — *β. brevirostris* Bornm. et Gauba (var. nov.); acheniis brevissime rostratis, ideo 4 mm tantum (nec 6 mm) longis. — Nur außerhalb des Gebiets, im Sefidrud-Tal bei Rudbar (20. V. 1935; no. 794). — Obschon das Merkmal der vom Typus abweichenden Form sehr augenfällig ist und dadurch die Köpfchen viel kürzer erscheinen, wage ich es nicht, — solange nicht reicheres Material davon vorliegt — daraufhin eine eigene Art aufzustellen. — B.

Tragopogon Straussii Bornm. (Pl. Straussiana, l. c. XX, 172; 1906). — Elburs, Hänge des Kuh-Daschteh, 2500 m (10. VII. 1934; no. 628). — Die besonders in den westlichen Teilen des mittleren Persiens (Medien) ziemlich häufige Art besitzt eine ziemlich große Verbreitung und wurde von mir im Jahre 1910 auch jenseits des Zweistromlandes, in Syrien bei Baalbek gesammelt, seinerzeit aber (in „Bot. Centralbl. l. c. XXXI, 231; 1914“ irrig noch als *T. porrifolius* L.“ angeführt (neu für die Flora Syriens). — B.

Tragopogon collinus DC. — Boiss. III. 746. — Elburs, auf dem Kuh-Daschteh und bei Kalak (21. u. 24. V. 1934; no. 667).

Tragopogon bupthalmoides (DC.) Boiss. — Boiss. III. 750. — *α. stenophyllum* Boiss. l. c. 751. — Keredj, Kuh-Daschteh, 2400 m (14. VII. 1935; no. 692).

β. latifolium Boiss. l. c. — Keredj, Kuh-Daschteh, 2400 m (10. VII. 1935; no. 691); Gatschesar, Hessarband (14. VII. 1935; no. 693); Keredj, wüste Plätze (14. VII. 1933; f. *intermedia*); Berge bei Kalak, 1500 m (21. V. u. 11. VI. 1934; no. 667, forma!).

Tragopogon graminifolius L. — Boiss. III. 753. — Keredj (9. X. 1934).

Scorzonera laciniata L. — Boiss. III. 757. — Keredj, in Gebüsch (6. V. 1933).

Scorzonera cana (F. et M.) Griseb. — Boiss. III. 757. — Elburs, bei Paschand (17. V. 1933; forma) und bei Keredj (11. VI. 1934). —