

pauca, subpersistens, turbinata, ovato-compressa, glabrescentia, pappo coronata rudimentario, achaenio 2—4-plo breviorib, e paleis ovato-oblongis, denticulatis n. 5 composito, obtusiusculis; achaenia disci ovato-turbinata, callo basiliari instructa, pentagona costis strigosa, transverse rugosa, pappo coronata achaenio 2—3-plo longiore, e paleis n. 5 ovato-lanceolatis constante in aristam denticulatam abeuntibus.

Herbae regionis mediterraneae mediae et orientalis vernalis, annuae, radice superne valde fibrillosa, hirti-villosae, foliis trinervibus, integris vel more Coronopis dentatis, radicalibus rosularibus, in axilla capitula rudimentaria foventibus, caulinis, palmaribus-pedalibus, subramosis, capitulis demum caducis, floribus citrinis involucro brevioribus.

1) *Piptoccephalum carpholepis* (χάρφη, stramen, et λεπίς, squama) C. H. Sz Bip.

Omnibus partibus P. luteo major; caulinis erectis, ramosis; capitulis 9—15 floribus; involucro pallente pollicari; floris sulphurei tubo ligula duplo brevior; achaenii 1½ lin. longis, radii pappo 2-plo longioribus, disci pappo, e paleis facto triangulari-lanceolatis, sensim in aristam abeuntibus, triplo brevioribus.

Catananche carpholepis Sz Bip. in litt. Icon. Rehb. f. ic. fl. germ. tom. XIX. t. 12. n. II. (*Catananche lutea*).

Radix annua, 1½—2 poll. longa, 1 lin. diametro metiens, fusiformis, verticalis, fibrillis numerosissimis, praecipue ad collum et hic saepius consertissimis et sursum spectantibus, instructa. Folia radicalia numerosa, 2—4 in 7 poll. longa, 3—7 lin. lata, lanceolata, obtusiuscula, in petiolum longum attenuata, trinervia, — repandodentata, rarius integriflora, glaucescentia, pilis simplicibus hirti-strigosa, sere semper more P. lutei, in axillis capitula nonnulla foventia pauciflora rudimentaria, involuci nempe foliolis abbreviatis et floribus subexsertis. Caulis solitarius v. plures, spithamei v. dodranthales imo sere pedales, erecti, teretes, striati — 1 lin. diametro metientes, parce ramosi, ramis quandoque infra, saepius ad v. supra medium in axilla foliorum radicalibus similium sed minorum orientibus, pilis patentia rectis hirti. Rami arrecti, esquamosi, sine capitulis 1—3 poll. longi, pl. monocephali, quandoque in axilla folii parvi vel squamae capitulo secundario muniti. Capitula semper erecta 9—15 flora; post achaeniorum maturitatem caduca. Involucrum virgineum ½ poll. longum, cylindraceum, acutum, florens et fructigerum turbinatum 1 poll. et ultra longum, scariosum, pallide stramineum, rarius + sordescens, 4-serialiter imbricatum; capitulis lapsis 6—7 involuci squamae persistunt extimae, scarioso-hyalinae, nervo obscuro percussae, 1—3 lin. longae, ovatae acutae; reliquae involuci squamae — 22 sunt ovato-lineares, intimae pollicem et ultra longae, 1½ lin.

latae, acutae v. acuminatae, margine superiore denticulatae, carina vix prominente percursae; intimae n. 5 basi callo cartilagineo corneo, 2 lin. longo, oblongo sunt munitae, dorso convexo, ventre, cui achaenia insident radialia, concavo. Receptaculum conico-ovatum, cavum, 1—1½ lin. altum, setis 1½ lin. longis, brunneis, dense obsitum. Flores involucro tertia parte breviores, 6½ lin. longi, sulphurei; tubus 2½ lin. longus, pallens, praecipue superne pilis articulatis munitus; ligula oblonga, 4 lin. longa, 1 lin. latitudo versus pilosa, apice 5-dentata. Antherae ultra 1 lin. longae, usque 1½ lin. infra ligulae apicem extensae, pallentes, basi breve caudatae, apice corona ovato-rotundata munitae; filamenta citrina exserta, glabra; pollen globosum echinulatum; stylis rami vix autheras superantes, breves, semi-circulariter retrorsi, infra cum stylis parte superiore aculeati, superne vero verruculosi, apice incrassato-rotundati. Achaeniae radii n. 3—5 in concavitate involuci squamarum intimarum nidulantis cum iisque subconcreta 1½ lin. longa, turbinate-ovata, compressa, glabrescentia, inferne attenuata, truncata, pappo coronata achaenio duplo brevior, rudimentario, e paleis scariosis ovato-oblongis, obtusiusculis, denticulatis, n. 5 compito; achaenia disci n. 6—10 ovato-turbinata, inferne attenuata et callo basiliari munita, superne truncata, 5-gona, pr. costis strigosa et more Pieridis transverse rugulosa, rugis 24-serialibus, pappo superata e paleis n. 5 composito, 3½ lin. longis, inferne ovato-triangulari-lanceolatis, et tunc in aristam sensim abeuntibus denticulatam.

Habitat *Piptoccephalum carpholepis* in Algeria, vere florens, e. g. El Arouch: Dr. Lorent! an. 1846; in campis pr. Boghar, 5. Apr. 1856: O. Debeaux!; Constantine: DuRieu!; locis herbidis pr. Constantine, 24. Apr. 1857: Choulette filii in fragm. fl. alger. exsic. n. 157; pr. Oran, 7. Apr. 1856: Cosson!; in planicie et collibus pr. Oran, vere: Durando! fl. atl. exsic. n. 31; in pratibus pr. Oran Apr.: Munby! pl. alger. exsic. n. 19; in campis calcareis pr. Oran: Balansa! pl. d'Alger. n. 494 (an. 1852) pr. Tiaret: Delestre! nec non in Hispania (an. introducta?) in campis incultis pr. Castijo Blanco pr. Roarda an. 1849: Bourgeau! pl. d'Espagne n. 298.

2) *Piptoccephalum luteum* C. H. Sz Bip.

Caulibus erectis v. adscendentibus, subsimplis; capitulis 22—26 floribus; involucro soridido, ½—¾ pollicari; florum radii, dorso lividorum tubo ligulam subaequante; achaenii, 1 lin. longis, radii pappo 4-plo longioribus, disci pappo e paleis composito ovato-lanceolatis abrupte in aristam abeuntibus, duplo brevioribus.

Catananche lutea (squamus calycinis inferioribus lanceolatis) Lin. sp. pl. ed. I, p. 812.

Catananche lutea, longo, nervoso dentatoque folio Vaill. act. paris. 1721. p. 216, n. 2.