

a. denticulata; glabra; folia denticulata. In Caucaso abundat.

β. anguloso-dentata; hirsuta; folia anguloso-dentata. In planitie Colchica.

713. *Lampsana grandiflora* M. B. Folia lyrata; foliolum supremum triangulari-acuminatum; Ligulae lacero-dentatae, semper duplo majores quam phylla anthodii; Corymbus glanduloso-hirtus. In Ossia.

714. *Lampsana intermedia* M. B. Folia lyrata; Folio- lum supremum triangulari-acuminatum; Ligulae lacero-dentatae, duplo majores quam anthodii phylla; Corymbus glaberrimus; Calathidia majora et pallidiora quam in specie antecedente. An satis distincta? In Georgia et Ossia.

715. *Koelpinia linearis* Pall. *a.* glabra. In planitie trans Araxem sita.

b. *Scorzonereae.*

716. *Leontodon hispidus* L. In Armenia boreali.

717. *Leontodon hastilis* L. In planitiibus Mingreliae et in alpiibus Ossiae.

718. *Podospermum Buxbaumii* C. Koch; Radix pluricaulis, capitibus sterilibus nullis; Folia pinnatifida; Pinnae ut rachis anguste oblongae, apiculato-setosae; *Rami striati*; *Anthodium subglabrum*; Ligulae ex apice dentibus 3 — 5 linearibus instructae, purpurascetes. In ipsa regione ut a cl. viro *Buxbaum* a me collectum et glabritie excepta in omnibus partibus cum planta ab hoc descripta et depicta (Cent. II. Tab. 22.) consentiens. *P. intermedium* Guss. sine dubio hic refert; *P. calcitrapifolium* Vahl (Symb. Tom. II., pag. 87.) phyllis apice tomentosus diversum et cum *P. Tenorii* DC. fortasse eadem species. *P. calcitrapifolium* DC. et Willd. sine dubio ad *P. laciniatum* DC. afferendum et solis laciniis ex medio latioribus diversum, quod Cl. G. D. J. Koch

jam monuit (Synops. pag. 426.). In planitie ad Araxem sita abundat.

719. *Podospermum heterophyllum* C. Koch; Radix multiceps, caulibus florigeris et capitibus sterilibus instructa; Caulis tomento brevi canus; Folia radicalia inferiora linearia, pinnis linearibus: superiora oblanceolato-linearia pinnis inferioribus obovatis ovatisque, superioribus oblongis instructa; Folia caulina 1 — 3juga; Rami sulcati. Calathidia fructigera duplo majora quam in specie antecedente. Ibidem minus crebrus.

720. *Tragopogon pratensis* L. In Georgia et Armenia abundat.

721. *Tragopogon pratensis* L. *caucasicus*; Forma alpina, caule abbreviato, ramis elongatis saepe adscendentibus et foliis brevioribus ex basi aequalibus. In regionibus alpinis Caucasi. *T. brevirostris* DC. fortasse hic referendus.

722. *T. floccosus* W. et K. A priori simili differt floribus majoribus, achaeniis et rostris dense muricato-dentatis et foliis basi latioribus caulem amplectentibus. In Armenia.

723. *Scorzonera suberosa* C. Koch; Tuber oblongum squamis crassis suberosis obtectum, plures scapos 1 — 2 folios gerens, trunco carens; Folia linearia scapos superantia, margine subundulata; Phylla ovato-lanceolata, villosa aut tantum ciliata; Flores lilacini; *S. Szovitsii* DC. (*S. mollis* F. et M.) trunco longe producto differt. In Somehetia meridionali in terra lapidosa abundat.

724. *Lasiospora lanata* F. et M. In tractu Bortschalo.

725. *Picris hieracioides* L. In Cartalinia.

c. *Lactuceae.*

726. *Lactuca Scariola* L. Ad Tiflin.

727. *Lactuca caucasica* C. Koch; Glaberrima; Dentes foliorum saepe spinescentes; Rami elongati ex basi caulis prae-