

T. khorasanicus Rech. fil., Fedde Rep. 48:154 (1940) — Khorasan: An Rainen im Atrek-Tal zwischen Shirwan und Budjnurd, ca. 1000 m (1796).

T. khorasanicus ist nach der Einteilung von Boissier, Flora orientalis 3:744 in die Gruppe „*Flaviflora Biennia-Rostro achaenio 2—4-plo brevior*“ einzureihen. Diese Gruppe besteht nur aus vier Arten, von denen keine eine Ähnlichkeit mit *T. khorasanicus* aufweist. Die Art ist durch die verhältnismäßig kleinen Köpfchen, die außerordentlich kurz geschnäbelten Achänen, die nicht verdickten Blütenstiele und die blaßgelben Blüten charakterisiert.

T. iranicus Rech. fil., Fedde Rep. 48:155 (1940) — Khorasan: Brachfelder bei Turbat-e Haidari (1590).

T. iranicus hat mit *T. khorasanicus* in den Dimensionen der Köpfchen und den blaßgelben Blüten eine gewisse Ähnlichkeit, unterscheidet sich jedoch von diesem durch die stark glauken, kurzen, gekrausten oberen Stengelblätter und durch die Früchte, die nur in ihrem oberen Teil rauh sind und in einen langen, feinen, am Grund des Pappus verdickten Schnabel auslaufen.

Podospermum canum C. A. Mey., Verz. Pfl. Kauk. 62 (1831) — Syn. *P. Jacquinianum* Koch Boiss. 3:757.

Var. nova *murdadense* Rech. fil. — Planta perennis, caule erecto, 20—40 cm alto, superne stricte ramoso, primum dense floccoso-puberulo, deinde \pm glabrescente, collo squamis magnis persistentibus squamoso, bases caulium anni praecedentis persistentes. Folia in lacinias anguste lineares saepe elongatas 2—4 (—5) mm latas divisa. Involucrum fructiferum 3 cm longum, involucris phyllis \pm 5 mm latis floccoso-pubescentibus. Achaenia glabra, \pm 10 mm longa, exteriora suberoso-alata, costata, costis lateralibus saepe dilatatis. Stipes achaeniorum 3—4 mm longus, quam achaenium sublatior. Pappus albus ad 15 mm longus.

Zentral-Elburs: Lehmig-salzige Hügel Halkedar bei Murdabad, südwestlich Keredj, 15. Juni 1937 (1054).

Hat mit *P. Jacquinianum* var. *vaginatatum* Boiss., Fl. or. 3:758 sub *Scorzonera* die persistierenden Blattscheiden gemeinsam, doch sind diese bei meiner Pflanze viel größer und breiter, die ganze Pflanze ist kräftiger, behaart und hat größere Köpfe.

Podospermum meshhedense Rech. fil., n. sp.

Rhizoma perenne multiceps. Caules tenues, e basi breviter vel longe decumbente ascendentes, 5—8 (—12) cm longi, inferne