

Груз. ССР. Месхетия. Аспиндзский р-н. В ущелье близ с. Аспиндза в зарослях *Nitraria*. 9. VII. 46. Собр. Д. Сосновский и И. Манденова.

От полупустынного вида *P. caipit* САМ отличается более узкими листьями и их долями, белым хохолком и семянкой.

Наше растение мы называем в честь И. П. Манденовой, совместно с нами собиравшей его.

*Podospermum Grigoraschvili* D. Sosn. sp. n.

Planta caespitosa, glaberrima. Rhizomate verticali, crasso apice multicipiti rosulas steriles caulesque floriferos edente. Caules angulato striati vel humiles 4—11 cm vel ad 25 (fructiferi) cm alti. Folia radicalia ad 9 m longa exteriora aut integra oblongo spatulata apice angustata; v. apice subdilatata basi dentibus binis praedita, sequentia ambitu oblongo pinnatifida, segmento terminali lateralibus multo maiore oblongo-lanceolato v. oblongo spatulato obtuso, lateralibus breviter linearibus, foliis omnibus petiolatis, petiolis basi dilatatis collum occultantibus; folia caulina pauca inferiora pinnatifida superiora simplicia lineari spatulata obtusa. Capitula (omnia fructifera) obconica 1—1,5 cm lata. Involucri phylla parce pilosiuscula nigrescentia oblongo lanceolata, obtusa. Achenia subincurva angulato striata olivacea pappo sordide ochroleuco achenio subduplo breviora. Perennis.

Georgia. Khevsuria. Fauces Khakhabo. 14. IX. 37. Leg. D. Grigoraschvili.

Species distinctissima characteribus descriptis ab omnibus speciebus caucasicis alpinis generi *Podospermi* eximie differt.

Speciem hanc memoriae collectoris eius D. Grigoraschvili morte audaciorum in bello contra Germaniam obito dedicamus.

Растение совершенно голое, образующее дерновники. Корневище вертикальное, толстое, на верхушке многоглавое, выпускающее бесплодные розетки и цветущие стебли. Стебли гранисто-бороздчатые, низкие, 4—11 см или (во время плодоношения) до 25 см выс. Прикорневые листья до 9 см дл., внешние либо цельные продолговато-лопатчатые, суженные на верхушке, либо на верхушке слегка расширенные, при основании снабженные двумя зубцами, последующие в очертании продолговатые, перисто-раздельные, верхушечный сегмент много крупнее боковых, продолговато-ланцетный или продолговато-лопатчатый, тупой, боковые коротко-линейные, все листья с черешками, при основании расширенными, охватывающими шейку; стеблевые листья немногочисленные линейно-лопатчатые, тупые. Корзинки (плодушке) обратно конические, 1—1,5 см шир. Листочки обертки бедно мелко волосистые, черноватые, продолговато-ланцетные, тупые. Семянки слегка изогнутые гранисто-бороздчатые, оливкового цвета, хохолок грязно-кремовый, почти в два раза длиннее семянки. Многолетник.

Груз. ССР. Хевсуретия. Ущелье Хахабо. 14. IX. 37. Собр. Д. Григорашвили.

От всех альпийских видов рода *Podospermum* хорошо отличается всеми вышеприведенными признаками.

Этот вид мы называем в честь впервые собравшего его Д. Григорашвили, погибшего смертью храбрых в борьбе с германскими захватчиками.

Ботанический сад АН Груз. ССР

Поступило 29. IX. 1947

Д. Сосновски

*Podospermum* чинсіндэн ики ени Гафгаз нөвү

ХУЛАСӘ.

Мүәллиф бу мәгаләдә Гафгаздан топланмыш *Podospermum* чинсінә мәнсуб олан ики ени нөвү тәсвир әдир.

1. *Podospermum Idae* D. Sosn.—чохилик бозумтул биткидир. Гүндүрлүйү 22 см-ә гәдәр, көвдәси түклүдүр. Ярмаглары садә, әнсияз лент шәкиллидир. Сәбәт чичәк групу тәрс конус шәклиндәдир. Чичәкләри сарыдыр. Тохумлары чылпаг ағдыр. Күрчүстанда Аспиндия району Аспиндза кәндинин яхынлығында дәрәдән топланмышдыр.

2. *Podospermum Grigoraschvili* D. Sosn.—чохилик, тамамилә чылпаг биткидир, көкүмсү көвдәләри чохла розет ярмаглары әмәлә кәтирир. Көвдәси чохвәчһли 4—11 см-дир. Яхын ярмаглары узунсөләк шәкилли бөлүнмүшдүр. Көвдә ярмаглары нисбәтән әнләшмишдир. Сәбәт чичәк групу тәрс конус шәклиндәдир. Тохуму азча әйридир. Күрчүстанда Ховсуретия яхынлығында Хахаба дәрәсиндән топланмышдыр.