

- Calendula bicolor Viv.* — Ile Gavdo.
Echinops glandulosus Weiss. — Sitia.
Carduus albidus M. Bieb. — Chersonisis.
Sonchus glaucescens Jord. — Enneachoria.
Phœnixopus alpestris Gdgr sp. n.¹.
Picridium tingitanum Desf. — Chersonisis.
— *maritimum Rchb.* — Chersonisis. Candie. Rethymo.
Taraxacum apenninum DC. — Lassithi.
Phalacroderis coa DC. — Mirabello.
Rhagadiolus intermedius Ten. — Enneachoria.
Podospermum syriacum Boiss. — Sitia
— *graminifolium Grisb.* — Mirabello.
— *idæum Gdgr* sp. n.².
Cichorium hirsutum Gren. — Canée.
Hedypnois monspeliensis Willd. — Candie. Sitia.
Specularia birta (Ten.) — M. Sphaciotes. Enneachoria.

apicem lævia, interna vero glabra, paleæ aristatæ, non carinatæ, planæ; achænia scabridula oblonga.

Hab. Creta orient., in prov. Sitia ad Phaneromani et Mavro.

Species nullæ affinis. Ab *E. exigua* S. S., cui accedere videtur, valde recedit caulis elongatis, foliorum et florum forma.

1. **Phœnixopus alpestris** Gdgr mss. — Probabilius perennis, radice crasso, elongato, fusiformi; rami diffusi, tenues, flexuosi, breves; folia inferiora pinnatisecta, segmentis parvis, integris, acutis, superiora integra; capitula sessilia, pauciora, plerumque solitaria, phylla involucri viridi-rubescens omnia subobtusa, ad margines pallida; flosculi 3-4, aurei; achænia oblonga, nigricantia.

Hab. Creta, in alpestribus Lassithi et montis Idæ.

Herba glaucescens, 1/2-pedalis, diffusa; capituli 8 mm. longi. — Notis indicatis a *Ph. vimineo* multum distat.

2. **Podospermum idæum** Gdgr mss. — Totum adpresse cano-argenteum, pubes illocoso-crispula; radix cylindrica, carnosa, collo non squamoso; folia omnia radicalia, conferta, longe linearia, valde crispoundulata, patulo-deflexa; caules scapiformes, monocephali, flexuosi, plerumque nudi, folia plus minusve æquantes; capitula parva; involucri cani angustati phylla pauca, inferiora subobtusa, externa vero oblongo-acuta, albo-marginata; flosculi sulfurei, concolores, involucro æquilongi, achænia externa sulcata, squamulosa, interna lævia; pappus niveus.

Hab. Creta, ad nives deliquescentes montis Idæ infra cacumen Timios Stavros et supra Platanos, sub dumetis *Berberidis creticæ*, in consortio *Chionodoxæ*, *Croci Sibthorpii*, *Dactylidis rigidæ*, *Centaureæ idææ*, *Corydalidis unifloræ* permultorumque aliorum rariorum.

A *P. villosa* Stev. ejusque formis valde recedit foliis confertis, dense rosulatis, linearibus, crispati, floribus minoribus, scapiformibus, phyllorum fabrica, pappo, etc.