

2. *M. HYOSKEROIDES*, foliis linearibus-oblongis sinuato-pinnatifidis, sæpe foliis paulò longiore simplicibus aut bifido, rostro achænio breviori. ♀ in insulâ Crêtâ. *Apargia hyoseroides* Sieb. pl. exa. Spreng. syst. 4. p. 664. *Deloderium taraxacifolium* Cass. et Less. l. oc. Radices videntur fibrosæ. Folia hirta aut glabrescens. Invol. pallidum glabrescens. Achæmium muricellatum. Pappi setæ albida basi squamoso-dilatata, plumis valdè deciduis. (v. s. in h. Boissier.)

DCCCVIII. *PODOSPERMUM* DC. fl. fr. ed. 3. v. 4. p. 61. Cass. dict. 4. p. 77. — *Podosperma* Less. syn. 133. non Labill. (1) excl. syn. Koch. et Moench. — *Scorzonera* sp. Linn.

Capitulum multiflorum. Invol. cylindraceum imbricatum. Receptaculum epaleaceum. Achænia conformia rostrata callo basi areolam cingente eximie elongato inflato adulto cavo stipitata. Pappus 1-serialis plumosus conformis. — Herbariæ regiones Mediterraneas pleraque habitantes, biennes aut perennes. Folia pleraque pinnatifida. Flores flavi. Recept. tuberculis styliformibus (pedicellulis floris reliquis) subechinatum.

* *Species genuina, foliis plerisque pinnatifidis.*

1. *P. OCTANGULARE* (Roth ex Steud. nom. phan. p. 753), caule erecto stricto glabro, foliis aliis in lobos lineares acutos integerrimos pinnatifidis, aliis præsertim superioribus integerrimis elongatis, invol. glabri (junioris octangulæ) squamis acuminatis. ♀ (2) in Siciliâ, Calabria, Lucania, Taurica, Volhynia, Hispania circâ Malagam (Boiss.) , campis argillosis. Scorzonera octangulæ Willd. sp. 3. p. 1506 excl. Gou. syn. Guss. pl. rar. p. 323. t. 55. f. 2. Scorzonera laciniata Jacq. austr. t. 356. Ped. Joaquinianum Koch syn. 425. Variet caule lævi aut versùs apicem muricellato. (v. s.)
2. *P. TAZONII*, caule erecto ramoso, foliis pinnatifidis, lobis linearibus-lanceolatis integerrimis, invol. squamis glabrescens apice internè penicillato-tomentosa. ♀ seu (2) in collibus et campis argillosis Calabriae et Lucaniae. Scorzonera Tazonii Presl del. prag. p. 116. Guss. pl. rar. p. 322. t. 55. f. Ten. syl. p. 289. Differre dicitur à *P. octangulare* capitulis duplò majoribus, invol. non angulatis.
3. *P. CALCITRAPIFOLIUM* (DC. fl. fr. 5. p. 455), glabrum, caulis ramosis ascendentibus, foliis pinnatisectis, segmentis ovalibus oblongisque obtusis, superioribus confluentibus, invol. squamis mucicis. ♀ in collibus et campis argillosis regionis Mediterraneæ, nempe in Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ, Africa Tingitanâ, Oriente. Scorzonera calcitrapifolia Vahl symb. 2. p. 87. Guss. pl. rar. 323. Scorz. rosedifolia Retz obs. 3. p. 42 non Linn. *Podospermum rosedifolium* DC. fl. fr. n. 2983. Scorz. plurifida Lam. fl. fr. 2. p. 83. — Barr. ic. t. 800. (v. v. et s.)
4. *P. INTERMEDIUM* (Guss. in litt. sub Scorz.), glabrum, caule erecto ramoso, foliis pinnatisectis, segmentis oblongis ferè linearibus acutis integris, summo longiore cum superioribus confluyente, invol. squamis mucicis. ♀ in pratis Galliæ australis circâ Albigam, Aginum et Brigantium, Pedemontû circâ Tendam, Siciliæ (Guss.), Caucasû (Mey.), Persiæ prov. Aderbeischan (Scow.). *Podospermum calcitrapifolium* Mey. enum. n. 500. — Buxb. cent. 2. t. 22. Cum *P. calcitrapifolio* olim et fortè non immeritò conjunxi, sed monente cl. Gussone potèb. nunc distinguo. Icon Barr. t. 799 hoc fortè pertinet. (v. v. et s.)
- β. *eriolanum*, foliorum lpbis lateralibus abbreviatis, invol. cylindraceo tomento cano vestito. — ad Euphratem legit cl. Chesney! An spec. propr.?
(v. s.)
- δ. *P. CANUM* (Mey. cauc. enum. n. 499), pube cinereâ subvillosa, caulis