

Planta usque 20 cm alta, foliis ca. 1 cm longis et 0.3 cm latis. Habitus potius *Micromeriae*.

Insignis statura depressa, foliis floribusque parvis, tubo corollino calyci subbilobato incluso — ideo ad *S. montanam* L., cui a cl. Trautvetter relata fuit, nullo modo collocanda.

Цикл *S. montana* s. l. в Кавказском крае, как показал беглый просмотр гербарного материала, распадается на значительное число морфологически хорошо охарактеризованных микроморфов с тесно ограниченными ареалами. Среди них наша *S. gunibica* помещена все же не может быть, вследствие довольно ясной двугубости чашечки. Из других районов Кавказа пока видеть ее не приходилось, но вероятно растение это распространено и в других частях известкового Дагестана.

19. ***Veronica arceuthobia*** G. Woron. nov. spec. (ser. *Orientales*). — Elata, tota pilis adpressis crispulis pubescenti-canescens; caulibus decumbentibus ramos floriferos strictos numerosos edentibus; foliis ambitu ovatis in lacinias anguste lineares vel subfiliformes partim decurrentes sectis; racemis longissimis multifloris pedunculis erecto-patulis erectisve, bracteis simplicibus vel tri- et plurifidis pedunculorum  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$  aequantibus, sepalis linearibus valde inaequalibus, exterioribus fere duplo longioribus, corollis intense coeruleis usque 6—7 mm diam.; capsula late obcordata cuneata sinu obtusissimo, valvis turgidulis, stylo capsulae altitudinem fere duplo superante.

Hab. in Transcaucasiae montibus Boz-dagh, distr. Khaldan (olim Aresch), in faucibus Oghrudzha inter *Juniperos*, ubi 19. IV. 1915 a me lecta.

A *V. Jacquiniana* Baumg. (vidi typicam!), cui immerito a cl. E. Wulf in Acta Horti Tiflisiensis et in schedis relata erat, differt primo intuitu statura elata, foliis in lacinias angustas sectis, pubescentia densiore, pedunculis strictis, capsulae forma et stylis longioribus etc. Nomen specificum ob habitationem inter *Junipereta* datum.

Растение это обычно среди можжевельников зарослей хр. Боз-даг в Халданском (б. Арешском) районе Азербайджана, и в свое время было отнесено Е. В. Вульфом в качестве разновидности (var. *bipinnatifida*) к *V. Jacquinii* Baumg. (у него подвид *V. austriaca* Jacq.), с которой имеет очень мало общего и сходного. Вероятно, распространена шире в аналогичных районах Закавказья.

20. ***Podospermum lachnostegium*** G. Woron. nov. spec. — Caule lanatulo, acute striato anguloso, a basi ramoso; foliorum laciniiis linearibus vel lanceolato-linearibus uti rachis alata nervis subtus praesertim albicantibus prominulis percursis, apice tenuiter acuminatis segmento terminali longiusculo; pedunculis axillaribus foliis longioribus nudis vel foliolo 1—2 lineari, acuto; involucri phyllis lanceolatis ab exterioribus ad intimos sensim auctis omnibus basi lana alba bombycina vel flaveola obtectis, conspicue nervosis, intus brevissime puberulo-asperis, extus apice marginibusque lanatulis; achenio tenuiter prismatico glaberrimo, pappi setis longe plumosis intertextis candidis.

Hab. in Ciscaucasiae prov. Kubanensi ad Chutor Zapadinski, ubi  
14. V. 1921, n° 655, leg. cl. C. Wwedensky.

Insignis capitulorum indumento floccoso. A *S. floccosa* Boiss. Fl. or. III,  
p. 758, differt laciniis foliorum acuminatis glaberrimis nec „flocco albo-globo-  
terminatis“, involucri phyllis basi nec ad apices floccosis, flosculis brevioribus.

---

G. N. WORONOW

## NEUE ARTEN DER KAVKASISCHEN FLORA

### Résumé

Der Verfasser gibt die lateinischen Diagnosen von 20 von ihm aufge-  
stellten neuen Arten.