

T. khorasanicus Rech. fil., Fedde Rep. 48:154 (1940) — Khorasan: An Rainen im Atrek-Tal zwischen Shirwan und Budjnurd, ca. 1000 m (1796).

T. khorasanicus ist nach der Einteilung von Boissier, Flora orientalis 3:744 in die Gruppe „*Flaviflora Biennia*-Rostro achaenio 2—4-plo brevior“ einzureihen. Diese Gruppe besteht nur aus vier Arten, von denen keine eine Ähnlichkeit mit *T. khorasanicus* aufweist. Die Art ist durch die verhältnismäßig kleinen Köpfehen, die außerordentlich kurz geschnäbelten Achänen, die nicht verdickten Blütenstiele und die blaßgelben Blüten charakterisiert.

T. iranicus Rech. fil., Fedde Rep. 48:155 (1940) — Khorasan: Brachfelder bei Turbat-e Haidari (1590).

T. iranicus hat mit *T. khorasanicus* in den Dimensionen der Köpfehen und den blaßgelben Blüten eine gewisse Ähnlichkeit, unterscheidet sich jedoch von diesem durch die stark glauken, kurzen, gekrausten oberen Stengelblätter und durch die Früchte, die nur in ihrem oberen Teil rau sind und in einen langen, feinen, am Grund des Pappus verdickten Schnabel auslaufen.

Podospermum canum C. A. Mey., Verz. Pfl. Kauk. 62 (1831) — Syn. *P. Jacquinianum* Koch Boiss. 3:757.

Var. nova *murabadense* Rech. fil. — Planta perennis, caule erecto, 20—40 cm alto, superne stricte ramoso, primum dense floccosopuberulo, deinde \pm glabrescente, collo squamis magnis persistentibus squamoso, bases caulium anni praecedentis persistentes. Folia in lacinias anguste lineares saepe elongatas 2—4(—5) mm latas divisa. Involucrum fructiferum 3 cm longum, involucri phyllis \pm 5 mm latis floccoso-pubescentibus. Achaenia glabra, \pm 10 mm longa, exteriora suberoso-alata, costata, costis lateralibus saepe dilatatis. Stipes achaeniorum 3—4 mm longus, quam achaenium sublatior. Pappus albus ad 15 mm longus.

Zentral-Elburs: Lehmig-salzige Hügel Halkedar bei Murabad, südwestlich Keredj, 15. Juni 1937 (1054).

Hat mit *P. Jacquinianum* var. *vaginatum* Boiss., Fl. or. 3:758 sub *Scorzonera* die persistierenden Blattscheiden gemeinsam, doch sind diese bei meiner Pflanze viel größer und breiter, die ganze Pflanze ist kräftiger, behaart und hat größere Köpfe.

Podospermum meshhedense Rech. fil., n. sp.

Rhizoma perenne multiceps. Caules tenues, e basi breviter vel longe decumbente ascendentes, 5—8(—12) cm longi, inferne

foliati, in ramos monocephalos simplices erectos abeuntes. Tota planta sordide viridis, subaraneoso-floccosa, glabrescens. Folia plana, in vivo carnosula, in sicco crasse membranacea, inferiora ad 3 cm longa, 5—7 mm lata, lanceolata, utrinque subaequaliter angustata, basi in petiolum sat brevem insensibiliter attenuata, apice acuta, margine integerrima, rarius pinnatifida, segmentis utrinque 3—5 acutis horizontaliter patentibus 1—2 mm latis; folia superiora anguste linearilanceolata, semper integerrima, sessilia. Capitula parva, pauciflora, involucri oligophyllo, phyllis indistincte triseriatis, in statu florendi ad 9 mm longo, 4 mm lato, in statu fructifero ad 15 mm longo, 10 mm lato; involucri phylla floccoso-tomentella, tenuissime longitudinaliter striato-nervosa, acuta, plurima sub apice minute cornuta, apicem versus saepe purpureo- et scarioso-hyalino-marginata. Ligulae aureae, involucri dimidio circiter longiores. Achaenia glabra, curvata, stipite cavo aequilato vix distincto provisa, stipite incluso \pm 7 mm longa. Pappus sordide albus, 7—8 mm longus, longe plumosus.

Khorasan: Strecke Meshhed—Turbat-e Haidari, im ausgetrockneten salzigen Schlamm bei Schachtari, Juli 1937 (1504).

Die Art ist durch verlängerte unterirdische Sproßteile, niederliegende bis aufsteigende dünne Äste, fleischige, breite, oft ganz ungeteilte, manchmal aber schwach gefiederte Blätter und kleine, arnblütige Köpfchen gekennzeichnet.

*Taraxacum*⁴⁾ *fulvipile* Harv. in Harv. & Sond., Fl. Cap. 3:527 (1859)

— Mazanderan: Feuchte Weideplätze im Talar-Tal zwischen Paß Gaduk und Abbasabad, ca. 2200 m (1990 a).

T. pseudonigricans Hand.-Mzt., Ann. Nat. Mus. Wien 20:427 (1905) — Zentral-Elburs: Nordhang des Kandawan-Passes, ca. 2400 m (957 a).

T. Stevenii (Spreng.) DC., Prodr. 7:149 (1838) — Zentral-Elburs: Nordhang des Kandawan-Passes, ca. 2700—3000 m, quellige Stellen (478 a).

T. officinale Web. in Wigg., Prim. Fl. Holsat. 56 (1780) — Mazanderan: Feuchte Weideplätze im Talar-Tal zwischen Paß Gaduk und Abbasabad, ca. 2200 m (1990 b); Zentral-Elburs: Nordhang

⁴⁾ Gattung *Taraxacum* bearbeitet von H. Handel-Mazetti.