

latis denticulatis, pedunculis elongatis incrassatis, seminibus apice attenuatis. ☉. In arvis Galliæ australis.

## 493. HELMINTHIA.

Involucrum duplex; interius 8-phyllum æquale, exterius 5-phyllum laxum; semina transversim striata; pappus plumosus, pedicellatus.

2976. *Echioides*. Involucri exterioris foliolis latis ovato-cordatis subspinosis. ☉. In arvis et ad vias.

2977. *Spinosa*. Involucri exterioris foliolis lanceolatis margine apiceque spinosis. — In Pyrenæis.

## 494. SCORZONERA.

Involucrum imbricatum, squamis margine membranaceis; receptaculum nudum; semina sessilia; pappus substipitatus, plumosus.

2978. *Hispanica*. Caule ramoso 5-6-floro, foliis amplexicaulibus integris basi denticulatis. ♀. In oleraceis hortis culta.

2979. *Humilis*. Caule subnudo subunifloro, foliis oblongo-lanceolatis 5-7-nerviis, involucri foliolis basi latis sublanatis. ♀. In pratis siccis.

2979\*. *Austriaca*. Caule subnudo unifloro involucrique squamis glabris, foliis lineari-sublanceolatis. ♀. E montibus Pedemontanis propè Bussolino misit cl. Balbis. — Sc. austriaca. Wild. Spec. 3. p. 1498.

2980. *Angustifolia*. Caule subnudo unifloro apice tomentoso, foliis sublinearibus basi lanatis, involucri squamis tomentosis lineari-oblongis. ♀. In rimis saxorum Alpium et montium editiorum Arvernæ.

2980\*. *Aristata*. Caule subnudo unifloro, foliis linearibus glabris, involucri squamis inferioribus foliaceis laxis subulatis florem æquantibus. ♀. In hecibus Pyrenæorum editiorum.

2981. *Hirsuta*. Caule unifloro hirto, foliis linearibus hirsutis, seminibus lanatis. ♀. In lapidosis sterilibus Occitanæ.

## 495. PODOSPERMUM.

Involucrum imbricatum, squamis margine membranaceis; semina pedicellata, pedicello cavo incrassato; receptaculum seminibus delapsis, tuberculato-muricatum; pappus sessilis, plumosus.

2982. *Subulatum*. Caule subramoso infra folioso supernè nudo, foliis rigidis linearibus carinato-subulatis. ♀. Sorricinii.

2982\*. *Muricatum*. Caule erecto subscabro subsimplici, foliis inferioribus linearibus, superioribus pinnatifidis, lobis remotis linearibus. ♀. Circà Tendam detexit cl. Balbis qui misit sub nomine Scorzonæræ muricatæ.

2983. *Resedifolium*. Caule basi ramoso, foliis linearibus pinnatifidis, lobis sublinearibus, superioribus simplicibus. ♀. In arvis Occitanæ, Delphinatûs, Parisiis.