

ramosis foliosis, foliis pinnatisectis, segmentis linearibus aentis, invol. squamis exterioribus apice calloso uncinatis. ② in campus Caucasi ad Talusch, Bakü, etc. alt. circ. 1000 hexap. (Mey!) forte in Olympo Bityno (Auch. I n. 3322). Scorz. laciñata Bieb. fl. taur. et suppl. n. 1576. Radix fusiformis. (v. s.)

f. glabratum, foliis glabris latioribus, aliis indivisis elongatis, aliis pinnatipartitis. ② in Caucasi regione alpinâ (Mey!), ad Guriel Persiae (Szow!). An certè conspecifica? (v. s.)

6. *P. LACINIATUM* (DC. fl. fr. ed. 3. n. 2984); glabriuscum, caulis suberectis apice nudis 1-cephalis, foliis pinnatisectis, rachi lobisque linearibus integris, invol. squamis apice subuncinatis. (2) in arvis pratis et asperis Europe australis, et in Galliâ et Germaniâ mediis. Scorzonerâ laciñata Linn. sp. 1114. Gærtn. fr. 2. p. 367. t. 159. f. 1. Scorz. paucifida Lam. fl. fr. 2. p. 83. Sc. petiolaris Lapeyr. abr. pyr. 120. excl. syn. ex Benth. (v. v. et s.)

f. muricatum, caule erecto muricato, foliis aliis indivisis, aliis pinnatisectis. (2) in Pedemontio, Galliâ australi, Scorzonerâ muricata Balb. misc. salt. p. 25. Podosp. muricatum DC. syn. fl. gall. n. 2982. (v. s.)

f. subulatum, caule erecto laevi, foliis linearisubulatis. (2) in Galliâ austr. Podosp. subulatum DC. fl. fr. n. 2982. Scorz. subplata Lam. fl. fr. 2. p. 81? Scorzonerâ pinifolia Gou. ill. 53? (v. s.)

** *Species dubia*, foliis omnibus linearibus integerrimis.

7. *P. VILLOSUM* (Stev. in litt.), molliter villosolanuginosum, caule erecto folioso polyccephalo, foliis linearibus carinatis integerrimis, invol. squamis exterioribus dorso lanuginosis, interioribus glabris. ② in collibus et campestribus Tauriæ (Beaup.!), circa Karassnar, Mosdok (Bieb.) et Sündak (Stev.). Scorz. villosa Bieb. fl. taur. n. 1569 non Scop. Achænia spinulosa sursum spectantibns aspera ex Bieb., sed in specim. meis (equidem junioribus) laevia. (v. s.)

8. *P. CALLOSUM*, caulis è collo plurimis apice nudis 1-cephalis, foliis linearibus planis integerrimis nervosis sparsè pilosis apice callosis, invol. squamis acuminatis margine scariosis, exterioribus subvillosis, achæniis laevibus. ② in pascais aridis calcareis Sardiniae versus Arcidano et Oliastro legit cl. Moris. Scorz. callosa Moris. elench. 1. p. 29. Flores flavi extus purpurascentes. (v. s.)

9. *P. COLUMNÆ* (Guss. in ind. sem. h. bocc. 1825. pl. rar. 324. t. 54. sub Scorzonerâ), caulis è collo plurimis apice nudis 1-cephalis, foliis linearibus carinatis sparsè villosis subhirsutis, invol. squamis acuminatis glabris; achæniis aspero-muricatis. ② in collibus aridis Calabriæ et Siciliæ. Sc. orientalis angustifolia semine longo aspero Tourn. cor. 36? Cor. flavæ extus purpurascentes. Achænia attenuata nec ut in Podospermis incrassata. (v. s.)

+ *Species exclusa*:

P. PURPUREUM Koch ex Steud. — Scorzonerâ purpurea

DCCCIX. *GEROPOGON* Linn. gen. 904. Lam. ill. t. 646. Gærtn. fr. 2. p. 374. t. 160. Cass. dict. 18. p. 498. Less. syn. 132. — *Tragopogonis* sp. Less.

Capitulum pluriflorum. Invol. 8-phyllo 1-seriale floribus longius, Recept. squamellis piliformibus ad latus florum exterius onustum. Achænia cylindracea longissimè rostrata striata, radii persistentia, disci decidua. Pappus radii circ. 5-paleaceus, paleis angustis acuminatis serrulatis; disci setis plurimis uniserialibus longè plumosis. — Herba annua Austr.-Europæ Tragopogonis facie glabra. Gaulis simplex aut rarius ramosus teres. Folia semiamplexicaulia elongata integerrima. Capitula ad apices subincrassatos caulis aut ramorum solitaria. Flores purpurascentes.

1. *G. GLABRUM* (Linn. sp. 1109). (1) in arvis inter ségetes circa Nicæam (All.).