

*Hieracium annuum montanum*, caule canaliculato.

*Morif. hist. 3. p. 68. f. 7. t. 5. f. 37.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 98.*

Habichtskrautartiger Hasenlattich. W.

*Habitat* in Gallia, Italia. ☉ (v. v.)

Calyx *laevis angustus angulatus*, auctus squamis minutissimis viridibus.

Calyx *multiflorus*. Pappus *sessilis*. W.

\* 26. *PRENANTHES squarrosa*.

P. foliis amplexicaulibus runcinatis, laciniis inferiorum lanceolatis sursum dentatis, superiorum linearibus integerrimis, panicula coarctata thyrsoides. W.

P. (*squarrosa*) foliis sessilibus runcinatis, laciniis recurvis dentatis. *Thunb. jap. 303.* \*

P. (*laciniata*) flosculis quinis, foliis laciniatis. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 46. t. 66. f. 1.* \*

Sparriger Hasenlattich. W.

*Habitat* in Japonia.

\* 27. *PRENANTHES multiflora*.

P. foliis petiolatis runcinatis, lobis ovatis dentatis, panicula fastigiata diffusa. *Thunb. jap. 303.*

Vielblumiger Hasenlattich. W.

*Habitat* in Japonia. ☉

Radix *fibrosa annua*. Caulis *infima basi ramosus erectus sulcatus villosus*, superne glaber paniculatus bipedalis. Folia radicalia subpetiolata runcinata glabra spithamea; lobi diffformes angulati setaceo-dentati; caulina sensim minora. Florum panicula fastigiata patens, pedunculis flexuosis, pedicellis capillaribus. *Thunb. l. c.*

\* 28. *PRENANTHES acanthifolia*. W.

P. foliis lyrato-runcinatis dentatis amplexicaulibus glabris, basi lanatis, floribus spicatis. W.

*Lactuca cretica* perennis altissima acanthi folio. *Tournef. cor. 35.*

Bärenklaublättriger Hasenlattich. W.

*Habitat* in Creta. 24

Folia fere *Acanthi mollis*, pedalia lyrato-runcinata amplexicaulia dentata utrinque glabra, basi interna la-

*na densa tecta.* Flores glomerati sessiles vel brevissime pedunculati et in spicam simplicem aggregati, magnitudine *P. purpureae*. W.

\*29. **PRENANTHES** *erysimifolia*. W.

*P. foliis lyrato-pinnatifidis dentatis, lobo terminali hastato, floribus dichotomo-corymbosis.* W.

*Chondrilla orientalis maxima Cichorii sylvestris folio.* Tournef. cor. 36.

*Hederichblättriger Hafenlattich.* W.

*Habitat in Ponto.* (v. f.)

*Caulis tripedalis erectus. Folia Erysimi officinalis pinnatifido-lyrata petiolata, lobis lateralibus oblongo-lanceolatis dentatis; terminali hastato-triangulari dentato. Corymbus divaricato-dichotomis nudus. Flores magnitudine P. hiearcifoliae.* W.

30. **PRENANTHES** *muralis*.

*P. foliis lyrato-pinnatifidis dentatis, lobo terminali quinquangulari, floribus paniculatis.* W.

*P. flosculis quinis, foliis runcinatis.* Hort. cliff. 383. Fl. suec. 645; 692. Roy. lugdb. 120. Dalib. parif. 235. Scop. carn. n. 964. Pollich. pal. n. 733. Fl. dan. t. 509. Hoffm. germ. 277. Roth. germ. I. 257. II. 337.

*P. foliis ferratis, pinnatis, pinna suprema triangulari, trilobata.* Hall. helv. n. 18.

*Sonchus laevis laciniatus muralis, parvis, floribus.* Bauh. pin. 124.

*Sonchus laevis vulgatiore.* 2. Clus. hist. 9. p. 136.

*Sonchus laevis sylvaticus* IV. Tabern. 194. Hall. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 45.*

*Mauer-Hafenlattich.* W.

*Habitat in Europae nemoribus umbrosis.* ☉ (v. v.)

*Pappus simplex, stipitatus.*

31. **PRENANTHES** *japonica*.

*P. foliis lyratis, lobis rotundatis obtusis, caule subnudo, panicula multiflora patula.* Thunb. jap. 302.\*

*P. flosculis quindenis, foliis radicalibus lyratis, caule subnudo.* Mant. 107.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 49.\**