

\*18. PRENANTHES *ramosissima*.

P. foliis caulinis linearibus integerrimis decurrentibus, radicalibus runcinatis acuminatis integerrimis, caule ramosissimo. W.

Prenanthes ramosissima. *Allion. ped.* n. 830. t. 33. f. 1. \*

Lactuca ramosissima pene lignosa, foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis lanceolatis. *Allion. nicaeens.* 87.

Vielästiger Hafenlattich. W.

*Habitat in sabulosis ad maris Nicaeensis littora.* ♂. ○. (v. s.)

Simillima *P. viminea*, differt vero: foliis radicalibus tantum runcinatis integerrimis apice acuminatis, caulinis omnibus linearibus, caule humiliore ramosissimo. W.

19. PRENANTHES *viminea*.

P. foliis decurrentibus inferioribus pinnatifidis extrorsum dentatis, summis linearibus, caule ramoso divaricato. W.

P. foliorum ramentis cauli adnatis. *Sp. pl.* 1120. *Gouan. monsp.* 469. *Jacq. austr.* t. 9. *Hoffm. germ.* 277.

P. foliorum laciniis extrorsum dentatis, ramentis foliacis cauli ramisque adnatis. *Vir. cliff.* 78. *Roy. lugdb.* 120. *Sauv. monsp.* 692.

Lactuca viscosa caule foliis obducto. *Tournef. inst.* 473.

Chondrilla viminea viscosa monspeliaca. *Bauh. pin.* 131. *prod.* 68.

Chondrilla viscosa, caule foliis obducto. *Bauh. pin.* 130.

Chondrilla saxatilis viscosa caule cnemidophora. *Colum. ecphr.* 1. p. 258. t. 240.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 9. p. 43.

Klebriger Hafenlattich. W.

*Habitat in Austria, Gallia, Lusitania.* ♂ (v. v.)

\*20. PRENANTHES *aspera*.

P. foliis ellipticis sessilibus spinulo-denticulatis, caule ramoso, pedunculis calycibusque subtomentosis.

Prenanthes aspera. *Schrader.*

Scharzfähniger Hafenlattich. W.

*Habitat — — — — — (v. s.)*

*Lin. Sp. Pl. Tom. III. P. III.*



*Caulis ramosus teres striatus laevis. Folia radicalia non vidi, caulinæ sessilia elliptica semipollicaria glabriuscula obtusa, margine denticulis teretibus rigidis spinulosis obsita. Pedunculi subspicati tomento tenui tecti. Calyx octophyllus calyculatus multiflorus basin versus subtomentosus. Corolla flava.* W.

## \* 21. PRENANTHES pinnata.

P. foliis pinnatis, foliolis lineariformibus, panicula corymbosa pedunculata, caule fruticoso. W.

P. fruticosa, foliis cum impari pinnatis multijugis, foliolis linearibus integerrimis, panicula composita.  
*Lin. suppl.* 347.

Strauchartiger Hasenlattich. W.

*Habitat in rupibus Teneriffæ. F. Masson.* 5 (v. f.)

*Frutex ramis teretiusculis resinosis. Folia approximata petiolata spithamea patentি-recurvata pinnata, pinnis decem-ad duodecim-jugis linearibus tenuissimis glaberrimis integerrimis. Panicula magna composita. Calyces glabri. Flores parvi lutei.*

## \* 22. PRENANTHES farmentosa. W.

P. foliis pinnatifidis laciniis rotundatis, caule humifuso, pedunculis unifloris squamosis. W.

P. (*farmentosa*) foliis lyrato - runcinatis, caule humifuso, floribus solitariis, calycibus multifloris. Willd.  
*phytog.* 10. n. 35. tab. 6. f. 2. \*

*Chondrilla minima repens asplenii foliis pilosis.* Shaw.  
*itin. app. n. 59. t. 21.*

Liegender Hasenlattich. W.

*Habitat in India orientali.* (v. f.)

*Radix perpendicularis crassitie pennae columbinæ. Folia ad radicem copiosa bi- vel tripollicaria profunde pinnatifida, laciniis rotundatis obtusis subdentatis. Caules siliformes humifusi bipedales simplices, per intervalla fasciculo foliorum (plerumque 2 f. 3.), cum pedunculo unifloro squamoſo, instructi.* W.

## \* 23. PRENANTHES asplenifolia. W.

P. foliis pinnatifidis, laciniis alternis oblongis rotundatis, scapis dichotomis. W.

*Hieracium dichotomum.* Roxburgh.