

Caulis ramosus teres striatus laevis. Folia radicalia non vidi, caulina sessilia elliptica semipollicaria glabrescens obtusa, margine denticulis teretibus rigidis spinulosa obsita. Pedunculi subspicati omento tenui tecti. Calyx octophyllus calycularum multiflorus basin versus sub-mentosus. Corolla flava. W.

21. *PRENANTHES pinnata.*

P. foliis pinnatis, foliis linearibus filiformibus, panicula corymbosa pedunculata, caule fruticoso. W.

P. fruticosa, foliis cum impari pinnatis multijugis, foliolis linearibus integerrimis, panicula composita. Linn. suppl. 347.

Strauchartiger Haselstamm. W.

Habitat in rupibus Teneriffae. F. Masfon. 3 (v. f.)

Frutex ramis teretibus resinosis. Folia approximata petiolata spithamea patenti recurvata pinnata, pinnis decem ad duodecim jugis linearibus tenuissimis glaberrimis integerrimis. Panicula magna composita. Calyces glabri. Flores parvi lutei.

\* 22. *PRENANTHES sarmentosa.* W.

P. foliis pinnatifidis laciniis rotundatis, caule humifuso, pedunculis uniloricis squamosis. W.

P. (*sarmentosa*) foliis lyrato-runcinatis, caule humifuso, floribus solitariis, calycibus multiloricis. Willd. phytog. 10. n. 35. tab. 6. f. 2.

Chondrilla minima repens alpina foliis pilosis. Shaw. itia. opp. n. 50. t. 21.

Liegender Haselstamm. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Radix perpendicularis crassitie penne columbinae. Folia ad radicem copiosa bi- vel tripollicaria profunde pinnatifida, laciniis rotundatis obtusis subdentatis. Caulis filiformes humifusi bipedales simplices, per intervallo fasciculo foliorum (plerumque 2 f. 3), cum pedunculo uniloricis squamoso, instructi. W.

\* 23. *PRENANTHES asplenifolia.* W.

P. foliis pinnatifidis, laciniis alternis oblongis rotundatis, scapis dichotomis. W.

Hieracium dichotomum. Roxburgh.

Streifenfarrenblättriger Hasenlattich. W.

*Habitat in India orientali. (v. f.)*

Radix perpendicularis simplex. Folia radicalia copiosa bi-vel tripollicaria pinnatifida, lactuiss oblongis obtusissimis subdentatis alternis. Scapi numerosi tri-vel quadripollicares pauciflori dichotomi divaricati. Pedunculi nudi. Calyx cylindricus multiflorus calyculatus. Pappus sessilis. Similis *P. sarmentosae*, W.

\*24. **PRENANTHES** *fonchifolia*. W.

*P. foliis runcinatis amplexicaulibus ciliato-denticulatis, panicula corymbosa nuda terminali. W.*

*Prenanthes indica. Klein in litt.*

Gänsefußblättriger Hasenlattich. W.

*Habitat in India orientali. (v. f.)*

Planta facie exacte *Souchi arvensis*. Caulis 4 pedalis erectus. Folia amplexicaulia runcinata ciliato-denticulata. Panicula terminalis corymbosa dichotoma. Pedunculi breves multiflori ad ramorum latera et in axillis foliorum. Flores ut in *P. murali*. W.

25. **PRENANTHES** *hieracifolia*. W.

*P. foliis radicalibus runcinatis, caulinis ovato-lanceolatis basi sagittatis, panicula corymbosa divaricata nuda. W.*

*Crepis (pulchra) foliis sagittatis dentatis, caule paniculato, calycibus pyramidatis glabris. Sp. pl. 1134. Gouan. monsp. 414.*

*Crepis foliis sagittatis dentatis, pedunculis superne turbinato-inflatis. Guett. stamp. 378. Dalib. parif. 238. n. 1.*

*Chondrilla hieracii folio annua. Tournef. inst. 238.*

*Hieracium pulchrum. Bauh. hist. 2 p. 1024.*

*Hieracium montanum hirsutum minus. C. B. Raj. hist. 234.*

*Hieracioides annua glutinosa floribus parvis. Faill. act. 1721.*

β. *Lapsana chondrilloides calycibus pyramidatis, seminibus papposis, foliis oblongis subdentatis scabris. Hort. upf. 245.*

*Hieracium montanum alterum leptomacrocaulon. Col. cephr. 1. p. 248. t. 249. Raj. hist. 234.*