

** *Folii caulinis petiolatis non amplexicaulibus. — Asiaticæ.*

3. P. BRUNONIANA (Wall. cat. n. 3278. comp. 388), caule erecto apice paniculato, foliis caulinis petiolatis ovato-lanceolatis mucronato-dentatis basi subcordatis et angustè decurrentibus apice acuminatis, summis lanceolatis, capitulis cylindricis 3-4-floris. — in Emodo Kamaonensi Ind. or. Variat glabra, aut caule foliisque secus paginæ inf. nervum pilosiuscula. Petiolus angustè marginatus integer ant dentatus et ideo folia infer. fortè sublyrata. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
4. P. QUINQUELOBA (Wall. cat. comp. n. 371), caule erecto simplici apice paniculato, foliis longè petiolatis cordatis grossè et acutè dentatis subquinquelobis, summis linear-lanceolatis inciso-dentatis imò linearibus integrerrimis, invol. 4-5-phyllis 4-5-floris. ? in Gossaini-Than Nepaliæ legit cl. Wallich. Radix fasciculato-fibrosa. Herba glabra circ. bipedalis. Invol. squamæ acutæ. (v. s. comm. cum priore.)
5. P. ALLIARIÆFOLIA, caule simplici apice paniculato hinc indè petiolisque præserit setiferis, foliis caulinis longè petiolatis cordatis acuminatis grossè dentatis, dentibus mucronatis, foliis paniculæ subsessilibus linear-lanceolatis, capit. cylindraceis elongatis 3-floris. — In Indiae orient. provinciis boreali-occident. legit cl. Royle. Capitula 8-9 lin. longa. Cor. purpureæ. Folia magnit. et formâ Alliarieæ. Setæ caulis et petiolorum subcrispæ septulatæ. (v. s. comm. à cl. Royle.)
6. P. RAPHANIFOLIA, glabra, caule erecto ramoso paniculato, foliis caulinis sessilibus basi attenuatis pinnatifidis acuminatis, lobis acutis dentatis, dentibus mucronatis, capitulis cylindraceis 3-floris. — in Indiae orient. provinciis occid. legit cl. Royle. Capit. 5-6 lin. longa. Cor. purpureæ. (v. s. comm. à cl. invent.)
7. P. HISPIDULA, caule apice ramoso, petiolis foliisque sparsè setoso-hispidulis, foliis caulinis aliis ovatis aliis trifidis, omnibus acuminatis dentatis, dentibus longè et callosè mucronatis, capitulis glabris cylindraceis 4-floris. — in Indiae orient. prov. occid. legit cl. Royle. Fl. purpurei. Capitula 6-7 lin. longa. Pappus densius quam priorum barbellatus. (v. s. comm. à cl. Royle.)
8. P. ROSTRATA (Blume! bijdr. p. 836), caule simplici apice paniculato, foliis infer. pinnatisectis, segmentis 5-7 aristato-dentatis ovatis longè acuminatis, super. pinnatipartitis, lobis angustioribus elongatis, omnium terminali majore, invol. 3-4-floris. — in sylvis altioribus montium ins. Javæ. — Caulis teres glaber fistulosus. Ramuli et nervi fol. jun. puberulo-pulverulentæ. Panicula longissima ovata. (v. s. comm. à cl. Blume.)

† *Species non satis notæ.*

9. P.? ERYSIMIFOLIA (Willd. spec. 3. p. 1543), caule erecto, foliis lirato-pinnatifidis dentatis, lobo terminali hastato, corymbo nudo divaricato dichotomo. — in Ponto. Chondrilla orientalis maxima Cichorii sylvestris folio. Tourn. Cor. 36. Ch. erysimifolia Poir. suppl. 2. p. 331. Cæt. ign.
10. P.? HISPIDA (Pall. itin. 1. app. n. 126. et ed. gall. app. n. 394), caule erecto ramoso virgato setis sparsis hispidulæ, foliis linearibus integrerrimis basi setosis, capitulis paucis erectis 8-10-floris, invol. 8-phyllis, pappo sessili. — in imperio Rossico ad ripas flum. Rhymni (Oural) montosæ infra Oropolim. Chondrilla hispida Poir. suppl. 2. p. 328. Flores pallidè flavi. Dissert à Prenanthe fl. flavis in inv. 8-10. An Chondrillæ ex Cass., an potius Youngiæ sp.?
11. P.? JAVANICA (Willd. sp. 3. p. 1534), caule erecto simplici, foliis caulinis cordato-amplexicaulibus oblongo-lanceolatis inæqualiter dentatis. . . . in Javæ detexit cl. Garcin. Hieracium Javanicum Burm. fl. ind. 174. t. 57. f. 1. Pren. Javanica Blume bijdr. 887? Sonchus Javanicus Spreng. syst. 3. p. 648. Corymbus 4-cephalus. Invol. glabra ecalyculata. Cor. purpureæ ex Burm. Panicula pyramidata ex Blume An duæ stirpes omnino eadem? An Mulgedii sp.?