

voluti; akoenia brunnea basi cylindrica apice dilatata costata, glabra pappo sordide albido.

Kouy-Tchéou: Rivière de Pa-Oua, mars 1911 (Jos. Esquirol, 2679).

982. **Vernonia Mairei** Lévl., nov. spec.

Herbacea erecta alta, flexuosa et glabrata planta; perennis; folia cordata acuminata triangularia glabra, reticulata sinuato-denticulata vel lobulata; nervis ad basin palmatis, superne pennatis; petiolo elongato; inflorescentia anguste paniculata, paniculis composita, bracteae capituli uniseriatae oblongae obtusatae brunneae costatae; lobi perianthii elongati, reflexi, tubo ad basim pileato: akoenio prismatico, hirtio; pappus rufus; flores albi.

Yun-Nan: Sur les rochers des montagnes, derriere Tong-Tchouan, 2600—2800 m, sept. 1911 (Maire).

983. **Serratula Darrisii** Lévl., nov. spec.

Planta subfrutescens, elata, ad apicem in ramulos monocephalos divisa et hispido-villosa; folia alterna breviter petiolata utrinque attenuata, subtus eminenter nervosa et villosa, parce dentata, ciliata; involucrium foliolis inaequalibus, externis brevioribus, latis, acumine reflexo; internis angustioribus et longioribus, acuminatis; involucrium villosum ad basim 2-bracteis in foliola inferiora pressis munitum; flores violacei; akoenia fusiformia, ad basim alabastriformia, ad apicem dilatata, striato-costata, intervallis villosis; pappus rufus, akoenio duplo longior.

Kouy-Tchéou: Ouest de Lo-Fou, 9 nov. 1905; sommets de Hong-Kon, 28 août 1911 (Jos. Esquirol, 2737).

984. **Prenanthes Chaffanjonii** Lévl., nov. spec.

Rhizomate lignoso; folia omnia radicalia, obovato-lanceolata, sinuata 20—24 × 5 cm glabra illa *Lactucæ sativæ* referentia; caulis bracteolis minutis et remotis exceptis, omnino nudus, sulcato-costatus; flores in racemos strictos et angustos dispositi lutei; bracteae involucrales externae breves acutae; internae 3-plo longiores, obtusatae; capitula 5—6 flora; ligulae striatae, apice 5-dentatae; stylo nigrescente; akoenia conica brunnea, pappo sordide.

Kouy-Tchéou: Route de Pe-Gai-Yn, oct. 1911 (Jos. Esquirol, 2728); environs de Kouy-Yang, mont du Collège, sept. 1898 (J. Chaffanjon in herb. Bodinier, 2468).

985. **Prenanthes hieracifolia** Lévl., nov. spec.

Caulis robustus 1,50 m circiter altus, teres, levis, glaber; folia ovata 10 × 5 cm, supra atro-viridia subtus livida grosse dentata ciliata acuta pilis raris consita, sessilia vel in petiolum alatum attenuata; flores laxè paniculati; involucrium constrictum, bracteis involucralibus linearibus, uninerviis obtusatis, ad apicem patentibus, 5—7 florum; akoenia brunnea striata. — Folia fere *Gynuræ pseudo-china*.

Kouy-Tchéou: Steppes et prairies, août-sept. 1911 (Jos. Esquirol, 2722).