

PRENANTHES *chondrilloides* flosculis undenis, caly-  
cibus octofidis, foliis lanceolatis, integris,  
& dentatis. Tab. 17.

**R**ADIX perennis, fustiformis, digiti minimi crassitie, ex-  
terne fordide alba.

**CAULIS** dodrantalis, & pedalis, erectus, ramosus, gla-  
ber, subnudus: rami alterni, dichotomi, patentes, cauli si-  
miles.

**FOLIA** crassiuscula, glabra, glauca: radicalia plurima sub-  
petiolata, ovato — lanceolata, alia integra, alia denticulata:  
caulina ad singulas ramorum divisiones exorta, lineari — lan-  
ceolata, sessilia, integra: summa denique brevissima.

**FLORES** in summis ramulis nascuntur bini, terni, &  
quaterni, pedunculis longioribus: pedunculi autem alii nu-  
di, alii unica squamula donati.

**CALYX** communis cylindraceus, glaber, squamis octo  
æqualibus, conniventibus, obtusiusculis: ad basin quinque  
inæqualibus, brevissimis, persistentibus.

**COROLLA** composita, non imbricata: corollulis herma-  
phroditis undecim æqualibus, in orbem simplicem positis.

Propria monopetalâ, lingulata, truncata, quinquedentata.

**FILAMENTA** quinque capillaria, brevissima. Anthera cy-  
lindracea, tubulosa.

**GERMEN** infra corollam propriam. Stylus filiformis, sta-  
minibus longior. Stigma bifidum.

Pericarpium nullum, nisi calyx communis.

Semina solitaria, oblonga, coronata pappo capillari, sti-  
pitato.

Receptaculum nudum.

A. A. Corollulæ duæ seorsim pictæ, cum pappo, & femine  
annexo.



*Prenanthes chondrilloides*