

que simplicissimus, sesquipedalis, basi purpureo striatus, adpersus setis albis raris. Folia Turritidis sagittata, amplexicaulia, indivisa, oblonga, scabra margine et imprimis carina albidis pilis; supra laevia, infima, denticulata. Flores alterni pedunculo vix calycis longitudine, bractea una alterave. Calyx cylindricus, striatus, adpersus tuberculis nigris seta alba. Calyx inferior brevissimus, foliolis subulatis persistentibus. Corolla lactea, subtus purpurascens, longitudine calycis. ©

- nudicaulis. 3. C. scapo nudo, flor. paniculatis. *Mant.* 278. Chondrilla lactuceae foro julienfis. *Raj. hist.* 228? Lactuca nudicaulis. *Murr. in comm. gott.* 1772. p. 73. t. 4.

211. PRENANTHES. *Recept. nudum. Cal. calyculatus.*  
 1120. *Pappus simplex, subsessilis.*  
*Flosculi simplici serie.*

- tenuifolia. 1. P. foliis linearibus integerrimis.  
 chinensis. 2. P. fol. lineari-ensiformibus integris dentatisque. *Thunb. jap. mspt.* M.  
 viminea. 3. P. foliorum ramentis cauli adnatis. *Jacq. austr.* t. 9. Chondrilla saxatilis viscosa, caule in emidophra. *Col. ecphr.* 1. p. 238. t. 240.  
 purpurea. 4. P. flosculis quinis, fol. lanceolatis denticulatis. — *Jacq. Fl. austr.* v. 4. t. 307. M.  
 muralis. 5. P. flosc. quinis, fol. runcinatis. *Fl. dan.* t. 509.  
 altissima. 6. P. flosc. quinis, fol. trilobis, caule erecto.  
 chondrilloides. 7. P. flosc. denis, calyc. octofidis, fol. lanceolatis; radicalibus indivisis subdentatis. *Mant.* 107.  
 japonica. 8. P. flosc. quindenis, fol. radicalibus lyratis, caule subnudo. *Mant.* 107.  
 alba. 9. P. flosc. plurimis, flor. nutantibus subumbellatis, fol. hastato-angulatis.  
 repens. 10. P. repens, fol. trilobis.  
 pinnata. 11. P. fruticosa, fol. impari-pinnatis multijugis: foliolis linearibus integerrimis, panicula composita. *Suppl.* p. 347.  
 integra. 12. P. fol. oblongis integris glabris, panicula coarctata. *Thunb. jap. mspt.* M.  
 debilis. 13. P. fol. ovatis integris, caule subnudo erecto. *Thunb. l. c.* M.