

Gummi ex hujus plantae radice emanans chëmico examini submit Geörgi act. acad. scient. petrop. a. 1779. P. 1. historica p. 68.

1592. *PRENANTHES tuberosa*. Steuën in mem. soc. nat. cur. mosq. 4. p. 59.

Pr. hispida. Flor. taur. cauc. n. 1592.

In fyluis Armeniae ibericae, versus fontes rivi Akstaplia, Aprili florens lecta.

Radix tuber sphaerotundum Anellanâ paullo majus: epidermide fuscescente. Pappi stipès femine multoties breuior, ut vulgò in hoc genere.

1593. *PRENANTHES erysimifolia*.

Pro hac varietatem Pr. muralis: paniculâ minus compactâ, descripsisse mihi modò videtur, qualem nuper et in filiis altioribus Tauriae maxime meridionalis legi.

1594*. *PRENANTHES deltoidea*.

Pr. calycibus suboctofloris, foliis runcinato-pinnatifidis dentatis subtus villosis: lobo terminali maximo deltoideo, floribus paniculatis.

Habitat in Iberiâ mediâ. D. *Wilhelms* in herb. gortenkenfi.

Caulis simplicissimus tripedalis teres striatus glaber. Folia magna: lobo terminali ita amplo, ut pars reliqua folii periculum late foliaceum auriculatum quodammodo referat; supra glabriuscula, subtus villis crispis sparfis pubescentia. Paniculâ glabra oblonga: ramis alternis, pedicellis alternis breuibùs squamatis. Flores magnitudine Pr. purpureae. Calyx suboctophyllus: foliolis glauco-viridibus apice purpurascèntibus; cæ-

lyculo circiter triplo breuiore: squamis lanceolatis inaequalibus. *Flosculi* 8-10 lutei. *Semina nigricantia*: *pappi pilosi* stipite breui.

1595. LEONTODON *Taraxacum*.

Definiatur: L. calyce exteriori reflexo: squamis subulato-lanceolatis, interioris squamis sub apice gibbis, foliis runcinatis dentatis pilosiusculis: lobis triangularibus retrofalcatis.

1595*. LEONTODON *glaucescens*.

L. calyce exteriori patulo: squamis ovato-lanceolatis, interioris squamis sub apice appendiculatis, foliis runcinato-pinnatifidis subdentatis glabris: lobis lineari-lanceolatis subfalcatis distantibus.

Taraxacum glaucescens. *Catal. hort. gorenk. a. 1812. p. 34.*

L. *Taraxaci* varietas foliis tenuissime laciniatis. *Treuiranus in repert. soc. nat. cur. berol. a. 1813. 2. p. 153.*

Habitat in campis argillofis subsalsis Caucaſo a ſeptentrione ſubiacentibus et in ditionibus Wolgenſibus inferioribus. ♀

Affinis maxime L. *Taraxaco*, *Differt* colore glauco *foliorum* tenuius lacinatorum, *calyculo* quidquam breuiore: squamis minus productis, et *calycis interioris* squamis sub apice non tantum incrassatis, sed squamulâ extante distinctâ auctis apiculo quasi duplicato.

1595**. LEONTODON *caucasicus*.

L. calyce exteriori laxo: squamis ovatis marginatis, foliis runcinato-pinnatifidis: laciniis retrorsum subimbricatis. *Steuens in mem. soc. nat. cur. mosq. 4. p. 60.*