

2882. RODIGIA *.

- commutata* * 1. R. caule ramoso foliisque hirsutiusculis, radicalibus runcinato-lyratis dentatis, caulinis amplexicaulibus sagittatis pinnatifidis, anthodio hispido. *Ins. ion. Sicil. ? Caucas. ?* (Crepis rhoeadifolia MB.)
- laevigata* * 2. R. scapo paucifloro, foliis radicalibus obovato-spathulatis dentatis anthodioque glabris. *Numidia. Sicilia.* (Seriola laevigata syst. veg. ed. 15. Vahl., S. alliata Bivon.)

2883. PRENANTHES.

* *Fruticosae.*

- spinosa* Forsk. 1. Pr. caule ramosissimo, ramis glaberrimis spinosis, foliis linearibus sinuato-dentatis sessilibus. *Hispania. Afric. bor. Aegypt. Arabia. Palaestina.* (Lactuca spinosa Lam. Desf.)
- pinnata* L. 2. Pr. ramis resinosis, foliis pinnatis glaberrimis, foliolis lineari-filiformibus integerrimis, panícula corymbosa. *Teneriffa.*
- arborea* Brouff. 3. Pr. ramis cinereis, foliis pinnatis glabris, foliolis linearibus acuminatis, corymbis pedunculatis proliferis. *Teneriffa.*

** *Herbaceae.*† *Folius indivisis.*

- aphylla* Nutt. 4. Pr. radice perenni, foliis radicalibus linearibus integerrimis, caulinis minutis subulatis, ramis 1floris, anthodio 8partito. *Florida.*
- juncea* Pursh. 5. Pr. radice repente tuberosa, foliis radicalibus nullis, caulinis minutis subulatis, caule ramosissimo, ramis 1floris, anthodio 5partito. *Louisiana.*
- attica* *. 6. Pr. caule ramosissimo subaphyllo, ramis divaricatis sulcatis spinoscentibus, foliis radicalibus lanceolatis spinoso-dentatis, anthodio pubescente flavo-aculeato. *Attica.* (Chondrilla ramosissima Sibth.)
- tenuifolia* 7. Pr. foliis amplexicaulibus lanceolato-linearibus longissimis integerrimis, pedunculis paucifloris, caule simplici. *Alp. grai. cott.*
- hispida* Pall. 8. Pr. foliis sessilibus linearibus integerrimis basi setosis, caule ramoso virgato hispido. *Ad fl. Ural.* (Neutiquam Rhyrnus, [melius Rhyrnus] ut Pallas. interpretatur, sed Daix Ptolem. Ergo non in Sibiria.)
- chinensis* Thb. 9. Pr. foliis sessilibus ensiformi-linearibus denticulatis integerrimis glaberrimis, floribus paniculatis cernuis. *China. Japon.*
- simplex* Pursh. 10. Pr. caule simplicissimo, foliis radicalibus lanceolatis sinuatis, superioribus lineari-lanceola-

- diversifolia* Ledeb. 39. Pr. caule simplici foliisque glabris, inferioribus pinnatifidis, laciniis linearibus acuminatis basi subdentatis, superioribus linearibus integerrimis, floribus subcorymbosis, anthodio scabro. *Imaus.*
- acanthifolia* W. 40. Pr. caule elato, foliis amplexicaulibus lyrato-runcinatis dentatis glabris basi lanatis, floribus fasciculatis subsessilibus. *Creta.*
- viminea* 41. Pr. caule ramoso subviscoso, foliis inferioribus runcinato-pinnatifidis, laciniis divaricatis acuminatis dentatis, summis linearibus decurrentibus, floribus lateralibus solitariis subsessilibus. *Europ. austr.*
- cymosa* * 42. Pr. radice carnosa, caule glabro superne ramoso, foliis inferioribus pinnatifidis, laciniis foliisque superioribus linearibus acuminatis integerrimis, floribus subcymosis, anthodio glabro. *Ins. Canar.* (Chondrilla cymosa et pinnatifida Poir.)
- sarmentosa* W. 43. Pr. caule filiformi prostrato, foliis radicalibus pinnatifidis, laciniis obtusis subdentatis, pedunculis 1floris squamosis. *Ind. or.*
- asplenifolia* W. 44. Pr. acaulis, foliis radicalibus pinnatifidis, laciniis oblongis obtusissimis, scapis dichotomis paucifloris. *Ind. or.*

2884. CHONDRILLA.

- juncea* 1. Ch. caule basi piloso, ramis virgatis medullofis, foliis radicalibus runcinatis hispidiusculis, superioribus lineari-lanceolatis integerrimis (subdentatis), anthodio glabriusculo. *Europ. Asia med.* (Ch. virgata Presl.)
- latifolia* MB. 2. Ch. caule basi piloso subramoso, foliis radicalibus runcinatis, caulinis lanceolatis, anthodio hispido. *Tauria.*
- graminea* MB. 3. Ch. caule basi laevi, foliis radicalibus subruncinatis, superioribus lineari-filiformibus, anthodio glabro. *Ad Volgam. Caucas.*
- crepioides* Syst. veg. ed. 15. 4. Ch. caule simplici hispidiusculo, foliis sagittatis amplexicaulibus scabris, infimis dentatis, anthodio hispido. *Pyren. m. Lapeyrouse.*
- triquetra* Labill. 5. Ch. caule ramoso triquetra, foliis radicalibus oblongis mucronatis subdentatis, caulinis lineari-lanceolatis subfalcatis, floribus lateralibus. *Libanus.*

2885. LEONTODON.

* *Involucro reflexo.*

- Taraxacum* 1. L. squamis involucri lanceolatis acuminatis, anthodii sub apice gibbis, foliis runcinatis dentatis pilosiusculis, laciniis 3angularibus. *Europ. Asia med. Amer. bor.* (Taraxacum erythrospermum