

na densa tecta. Flores glomerati sessiles vel brevissime pedunculati et in spicam simplicem aggregati, magnitudine P. purpureae. W.

*29. PRENANTHES *erysimifolia*. W.

P. foliis lyrato-pinnatifidis dentatis, lobo terminali hastato, floribus dichotomo-corymbosis. W.

Chondrilla orientalis maxima Cichorii sylvestris folio.
Tournef. cor. 36.

Hederichblättriger Hasenlattich. W.

Habitat in Ponto. (v. f.)

Caulis tripedalis erectus, Folia Erysimi officinalis pinnatifido-lyrata petiolata, lobis lateralibus oblongo-lanceolatis dentatis; terminali hastato-triangulari dentato. Corymbus divaricato-dichotomus nudus. Flores magnitudine P. hieracifoliae. W.

30. PRENANTHES *muralis*.

P. foliis lyrato-pinnatifidis dentatis, lobo terminali quinquangulari, floribus paniculatis. W.

P. flosculis quinis, foliis runcinatis. *Hort. cliff.* 383.
Fl. suec. 645; 692. *Roy. lugdb.* 120. *Dalib. paris.* 235. *Scop. carn.* n. 964. *Pollich. pal.* n. 733. *Fl. dan.* t. 509. *Hoffm. germ.* 277. *Both. germ.* I. 257. II. 337.

P. foliis ferratis, pinnatis, pinna suprema triangulari, trilobata. *Hall. helv.* n. 18.

Sonchus laevis laciniatus muralis, parvis, floribus. *Bauh. pin.* 124.

Sonchus laevis vulgatior. 2. *Cluf. hist.* 9, p. 136.

Sonchus laevis sylvaticus IV. *Tabern.* 194. *Hall. R.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9, p. 45.

Mauer-Hasenlattich. W.

Habitat in Europae nemoribus umbrosis. ⊖ (v. v.)

Pappus simplex, stipitatus.

31. PRENANTHES *japonica*.

P. foliis lyratis, lobis rotundatis obtusis, caule subnudo, panicula multiflora patula. *Thunb. jap.* 302.*

P. flosculis quindenisi, foliis radicalibus lyratis, caule subnudo. *Mant.* 107.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9, p. 49.