

que simplicissimus, sesquipedalis, basi purpureo striatus, adpersus setis albis raris. Folia Turritidis sagittata, amplexicaulia, indivisa, oblonga, scabra margine et imprimis carina albidis pilis; supra laevia, infima, denticulata. Flores alterni pedunculo vix calycis longitudine, bractea una alterave. Calyx cylindricus, striatus, adpersus tuberculis nigris seta alba. Calyx inferior brevissimus, foliolis subulatis persistentibus. Corolla lutea, subtus purpurascens, longitudine calycis. ©

- nudicaulis. 3. C. scapo nudo, flor. paniculatis. *Mant.* 278. Chondrilla lactuceae foro juliensis. *Raj. hist.* 228? Lactuca nudicaulis. *Murr. in comm. gott.* 1772. p. 73. t. 4.

211. PRENANTHES. *Recept. nudum. Cal. calyculatus.*
 1120. *Pappus simplex, subsessilis.*
Flosculi simplici serie.

- tenuifolia. 1. P. foliis linearibus integerrimis.
 chinensis. 2. P. fol. lineari-ensiformibus integris dentatisque. *Thunb. jap. mspt.* M.
 viminea. 3. P. foliorum ramentis cauli adnatis. *Jacq. austr.* t. 9. Chondrilla saxatilis viscosa, caule in emidophra. *Col. ecphr.* 1. p. 238. t. 240.
 purpurea. 4. P. flosculis quinis. fol. lanceolatis denticulatis. — *Jacq. Fl. austr.* v. 4. t. 307. M.
 muralis. 5. P. flosc. quinis, fol. runcinatis. *Fl. dan.* t. 509.
 altissima. 6. P. flosc. quinis, fol. trilobis, caule erecto.
 chondrilloides. 7. P. flosc. denis, calyc. octofidis, fol. lanceolatis: radicalibus indivisis subdentatis. *Mant.* 107.
 japonica. 8. P. flosc. quindenis, fol. radicalibus lyratis, caule subnudo. *Mant.* 107.
 alba. 9. P. flosc. plurimis, flor. nutantibus subumbellatis, fol. hastato-angulatis.
 repens. 10. P. repens, fol. trilobis.
 pinnata. 11. P. fruticosa, fol. impari-pinnatis multijugis: foliolis linearibus integerrimis, panicula composita. *Suppl.* p. 347.
 integra. 12. P. fol. oblongis integris glabris, panicula coarctata. *Thunb. jap. mspt.* M.
 debilis. 13. P. fol. ovatis integris, caule subnudo erecto. *Thunb. l. c.* M.

- dentata.* 14. P. fol. oblongis dentatis glabris, caule paniculato. *Thunb. l. c. M.*
- hastata.* 15. P. fol. hastatis amplexicaulibus dentatis, caule ramofo. *Thunb. l. c. M.*
- humilis.* 16. P. fol. lyratis: lobis obtusis, caule subnudo, floribus terminalibus subternis. *Thunb. l. c. M.*
- multiflora.* 17. P. fol. petiolatis runcinatis, lobis acutis dentatis, panicula fastigiata diffusa. *Thunb. l. c. M.*
- lyrata.* 18. P. fol. runcinato lyratis dentatis, panicula coarctata. *Thunb. l. c. M.*
- squarrosa.* 19. P. fol. sessilibus runcinatis: laciniis recurvis dentatis. *Thunb. l. c. M.*

912. LEONTODON. *Recept. nudum. Cal. imbricatus, squamis laxiusculis. Pappus plumosus.*

1124.

- Taraxacum.* 1. L. calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis laevibus. *Fl. dan. t. 574. — Mill. illustr. ic. M.*
- bulbosum.* 2. L. fol. oblongo-ovatis subdentatis glabris, calyce laevi, scapo superne hirta.
- aureum.* 3. L. fol. runcinatis, caule subunifolio, calyce hispido. *Andryala aurea. Scop. ann. 2. p. 59. Receptaculum villosum. Scopol.*
- hastile.* 4. L. scapo calyceque laevi, fol. lanceolatis dentatis integerrimis glabris. — *Jacq. Fl. austr. v. 2. t. 164. M.*
- tuberosum.* 5. L. fol. runcinatis scabris, calyce acuto hirsuto.
- autumnale.* 6. L. caule ramofo, pedunc. squamosis, fol. lanceolatis dentatis integerrimis glabris.
- alpinum.* 7. L. calyce toto erecto et scapo infra florem hispidis, fol. dentatis subpilosis, fetis simplicissimis. *Jacq. in Litt. Fl. austr. v. 1. t. 93.*
- hispidum.* 8. L. calyce toto erecto, fol. dentatis integerrimis hispidis: fetis furcatis. — *Fl. dan. t. 862. M.*
- hirtum.* 9. L. calyce toto erecto, fol. dentatis hirtis: fetis simplicissimis. *Folia rigidula, tactu quasi arida, laciniis obliquatis. Calycis foliola extrema basi utrinque dilatata mediante plica.*
- tomentosum.* 10. L. calyce oblongo, fol. lanceolatis indivisis subtus tomentosis, pappo stipitato. *Suppl. p. 347.*